


F H A I L M


N R V X

11152











PHARMACOPŒIA
BRUXELLENSIS.

Scapellato, fecit

Rel's 11152

111(2)

PHARMACOPOEA


BRUXELLENSIS

SENATUS

AUTHORITATE

MUNITA.

EDITIO ALTERA.



BRUXELLIS,
Typis FRANCISCI FOPPENS

M. DCCII.

Collected by me 1/17/1917

2. *Thalassidroma*

leucorhynchos

leucorhynchos

leucorhynchos

leucorhynchos

leucorhynchos

leucorhynchos

leucorhynchos

leucorhynchos

leucorhynchos



NOBILISSIMO
AMPLISSIMOQUE
SENATUI
BRUXELLENSI.

*Nobilissimi Amplissi-
mique Domini,*

E Mendatiorem
Pharmacoo-
pœam in lu-
cem edituri non diu
hæsimus dubii cui po-
tissi-

DEDICATIO.

tissimum nomini eam
 dedicaremus: Etenim
 cum vos & Civium Ve-
 strorum incolumitati
 studio indefesso prospice-
 re & salutis omnibus
 modis consulere, & ut
 florentes ac beati vitam
 agant paternâ benevô-
 lentiâ curare non desi-
 natis, alia auspicia quàm
 Vestra aliudque patro-
 cinium non potuit
 opus hoc jam pulchrius
 renascens desiderare.
 Nam sanitati & vitæ
 tum

DEDICATIO.

tum Vestræ quæ nobis,
 tum Vestrorum Ci-
 vium quæ vobis tam
 chara est mirificè pro-
 spicit, dum quo pon-
 dere quâ mensurâ com-
 positiones & mixturæ
 vel ad tollendos mor-
 bos vel ad præservan-
 dam à morbis valetu-
 dinem vel ad curanda
 vulnera fieri debeant,
 accuratè, breviter ac di-
 lucidè præscribit. Non
 licet in his sine valetu-
 dinis aut etiam vitæ

DEDICATIO.

periculo errare. His
diligenter fervatis me-
dela speranda est & cor-
porum sanitas, quæ ad
publicum bonum au-
gendum ornandum-
que conducit. Vestris
itaque prodit auspiciis,
à Vestro nomine splen-
dorem auctoritatemque
accipiet, nec Zeïlorum
dentes, Vestro tutum
patrocinio opus mole
exiguum utilitate ma-
gnum pertimescet: hoc
vobis addito veteri illo

DEDICATIO.

ὑγιαίνειν καὶ εὐπράττειν,
suosque pariter labores
Machaoniamque ar-
tem consecrant

*Nobilissimi, Amplissi-
mique Domini,*

Humillimi clientes

COLLEGII MEDICI ASSESSORES.

EXTRACTUM

*Ex Mandato Nobil. & Ampliss.
Magistratûs super hoc dispen-
satorium.*

UT fit ordo generalis & unifor-
mitas in dispensatione reme-
diorum in omnibus hujus ur-
bis Pharmacopoliis mandat NOBILISS.
ET AMPLISS. SENATUS, quòd omnes
Pharmacopœi in posterum teneantur
sequi hoc dispensatorium à *Coll. Med.
Assess.* dicti Senatûs autoritate evul-
gatum omnesque in eo contentas com-
positiones sic conficere & in officinis
asservare sub multâ duodecim flore-
norum pro quacumque quæ aliter fa-
cta, in visitatione officinarum suo tem-
pore faciendâ invenietur, interim in
casu difficultatis vel dubii quod iidem
Pharmacopœi teneantur Colleg. Med.
consultare antequam pro arbitrio suo
aliquid mutare possint. Publicatum
Bruxellis die 20. Martii 1702.

Signatum C. ZEGHERS.

BENE.



BENEVOLO LECTORI.

HÆc est tertia Pharmacopœæ nostræ facies, quam necessitas extorsit. Cum ultimæ Editionis nulla amplius extarent exemplaria, nos ad aliam evulgandam accingere coacti fuimus. Quapropter hanc damus non novam, sed ultimam hinc inde emendatam, & commodiori typo recusam, eundem ubique ordinem secuti. Multa tamen studio omisimus quæ nullo modo vel raro in praxi erant ne nimium Pharmacopœorum officinæ expensis inutilibus gravarentur, multa autem quæ in usu quotidiano erant, & quæ in alterâ desiderabantur adjecimus, ut ubique uniformitas tam necessaria in dispensandis remediis hac in urbe conservaretur; quod

AD LECTOREM.

quod & non leve hujus Editionis argumentum fuit. Paucis instructa remediis officina satisfacere potest, cum nullus Medicorum sit in praxi versatus (si plura desideret) quin ex tempore & ad libitum quascumque Compositiones concinnare possit. Si quibus autem tyronibus ea nimis jejuna esse videatur, discant nos tantum dispensatorium proponere, & discant sub Magistris in arte peritis laborare; si quid prolixius voluerint adeant Autores gravissimos qui eâ de re ex professo scripserunt quos consulere poterunt. Nos contenti fuimus regulam seu normam ponere secundum quam officinæ nostræ hac in urbe semper instructæ esse debent. Interim benevole Lector si quæ mendæ irrepperint quas evitare non est facile, eas ut benignè corrigere velis precamur. Vale & fruiere.

J. M.

CARA-

CARACTERES CHYMICI

etum	✠	Kora	✠
et. destillatum	⊕	Ignis	△
ir	△	Jupiter	♂
s Viride	⊕	Luna	♀
embius	✕	Mars	♂
umen	○	Massa	♀
nalgama	aaa	Mercurius	♂
timonium	⊙	Merc. precipitatus	♂
qua	▽	Merc. sublimatus	♂
qua fontis	Font	Nitrum	⊙
qua fortis	F	Nax	⊙
qua Regia	R	Oleum	⊙
qua Ros.	Rd	Plumbum	h
rena	⋯	Precipitare	h
rgentum	☾	Pulvis, Pulverare	h
rgent. vivum	♀	Retorta	6
senicum	∞	Sal Armoniacum	*
uripigmentum	⊙	Sal Commune	⊙
urum	⊙	Sal Gemmae	⊙
alneum	B	Sol	⊙
aln. Mariae	MB	Spiritus	S.p.
olus Armena	B	Stannum	♂
alx viva	ψ	Stimmi. Antim.	♂
ancer	♂	Strat. sup. Strat.	SSS.
aput mort.	⊙	Sublimare	h
alcantb. vitriol	⊕	Sulphur	△
halybs	♂	Tartarum	□
halybis limatura	♂	Terra	▽
neres	♀	Venus	♀
nnabaris	⊙	Vinum	♀
rucibul.	✠	Vitriolum	⊕
estillare	♂	Urina	□
ies	⊙		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

POND.

PONDERA MEDICA ET MENSURÆ.

anum	Significatur	per G. vel gr.
solus,	℥β.	} et pendet {
rupulus,	℥j.	
achma,	℥j.	
nuncia,	℥ss.	
cia, per	℥j.	
qui uncia,	℥j.β.	
ibra,	lib.β.	
bra,	lib.j.	
qui libra,	lib.j.β.)	
		gr.x.
		gr.xx.
		℥iij.
		℥iiij.
		℥viij.
		℥xij.
		℥vj.
		℥xij.
		℥xviij.

anipulus est, quantum manu comprehendi potest, et
significatur per M. j.

agillus est, quantum tribus digitis capi potest, et
exprimitur per Pug. j.

ant præterea Medicis familiares, alie abbreviationum
otæ: utpotè

.	} id est {	numero.
.		ana. i. cujusque vel singulorum.
r.		paria.
t. æq.		partes æquales.
.		quantum sufficit.
a.		secundum artem.
M.		Balneum Mariæ vel Maris.

MEMORANDUM
FOR THE RECORD

1. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 2. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 3. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 4. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 5. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 6. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 7. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 8. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 9. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*
 10. *Quoniam in hoc mundo non est iustus qui recte cupit perire.*

the subject

PHAR-



PHARMACOPOEA BRUXELLENSIS.

CLASSIS PRIMA.

De Simplicibus Officinalibus.

Radices.



Cori *sive* Ca-
lami aroma-
tici officina-
rum.

Alcannæ.

Althææ.

Angelicæ.

Apii.

Ari.

Aristol. longæ.
rotundæ.
tenuis.
fabaccæ.

Asari.

Asparagi.

Bistortæ.

Bryoniæ.

Cariophyllatæ.

Chelidoniæ.

Chinæ.

Cichorei.

Consolidæ majoris.

Contra-yervæ.

Costi.

Cucumeris asinini.

Curcumæ.

Cyclaminis.

Cynoglossi.

Cyperi longi.

rotundi.

Dictamni albi.

Doronici Romani.

Eryngii.

Ebuli.

Esulæ utriusque.

Filicis.

A

Fœni-

Fœniculi.
 Galangæ.
 Gentianæ.
 Glycirrhyzæ.
 Graminis.
 Helenii.
 Hellebori albi.
 nigri.
 Hermodactylorum.
 Ialappæ.
 Imper. *sive* Ostrutii.
 Iridis Florentinæ.
 Mandragoræ.
 Mechoacannæ.
 Meu.
 Nymphææ.
 Ononidis.
 Osmundæ regalis *si-*
 ve Filicis palustris.
 Pæoniæ maris.
 Pentaphylli.
 Petalitidis.
 Petroselini.
 Peucedani.
 Phu *sive* Valerianæ.
 Polypodii quercini.
 Pyrethri.
 Rhabarbari.
 Rhapontici.
 Rubiæ tinctorum.
 Rusci.
 Spica nardi Celtica.
 Indica.
 Saxifragiæ.

Scyllæ.
 Scorzonæræ.
 Scrophulariæ.
 Tormentillæ.
 Turbith.
 Tussilaginis.
 Vincetoxici.
 Zarsæ parillæ.
 Zedoariæ.
 Zinziberis.

Fungi.

A Garicus.
 Auriculæ Judæ.
 Orbicularis. *Belgicæ*
 Bovist.

Cortices.

A Rantiorum.
 Capparu m
 Cassiæ lignæ.
 China Chinæ.
 Cinnamomi.
 Citriorum.
 Fraxini.
 Glandium calices.
 Granatorum.
 Guajaci.
 Macis.
 Tamarisci.
 Winterani.

Ligna

Ligna.

A Loës.
 Aspalathum.
 Guajacum.
 Nephriticum.
 Rhodium.
 Santalum album.
 citrinum.
 rubrum.
 Sassafras.
 Visçi quercini.

*Folia , &
 Herbæ.*

A Brotani maris.
 Absynt vulgaris.
 Romani.
 Adianthi albi,
 Nigri.
 Agrimonix.
 Alchimillæ.
 Althææ.
 Anethi summitates.
 Artemisiæ.
 Betonicæ.
 Botryos.
 Calaminthæ.
 Capilli Veneris ,

Cardui benedicti.
 Centaurei minoris
 summitates.
 Ceterach.
 Chamædrios.
 Chamæpiteos.
 Cuscutæ cum flori-
 bus.
 Dictamni cretici.
 Epithymi.
 Erysimi.
 Eupatorii cannab.
 Euphrasiæ cum flo-
 ribus.
 Farfaræ *sive* Tussi-
 laginis.
 Fumariæ.
 Hyperici summit.
 Hyssopi.
 Lavendulæ.
 Lauri.
 Lupuli.
 Majoranæ.
 Malvæ.
 Marrubii *sive* Prassy.
 Matricariæ.
 Melissæ.
 Menthastrî.
 Menthæ crispæ.
 aquaticæ.
 Mercurialis.
 Nepethæ.
 Ocymi s. Basilici.
 A 2 Ori.

Origani cretici.
vulgaris.

Parietariæ.
Persicariæ.
Phyllitidis.
Pilosellæ.
Pimpinellæ.
Polii montani.
Polygoni.
Polytrichi *seu* Tri-
chomanis.
Pulegii.
Pulmonariæ.
Pyrolæ.
Quercus.
Rorismarini.
Rutæ.
Rutæ murariæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Saniculæ.
Satureiæ.
Scabiosæ.
Scolopendrii.
Scordii.
Senæ.
Serpilli.
Thymi cum flor.
Tuftilaginis f. far-
faræ.
Verbafci.
Verbenæ.
Veronicæ.

Violariæ.
Virgæ aureæ.

Flores.

BAlaufia.
Betonicæ.
Bugloffæ.
Borraginis.
Calendulæ.
Chamomeli vulg.
Romani.
Cariophylli *seu* Tu-
nicæ.
Crocus.
Geniftæ.
Lavendulæ.
Lilliorum conval-
lium.
Malvæ arboreæ,
hortenfis.
Meliloti.
Nymphææ albæ.
Pæoniæ.
Papaveris erratici.
Rorismarini.
Rofarum rubrar.
Salviæ.
Sambuci.
Schænantum.
Stœchados.
Tiliæ.
Verbafci.

Vio-

Violarum.

Semina.

Acetosæ.
 Agni casti.
 Althææ.
 Ammios.
 Amomi.
 Anethi.
 Anisi.
 Apii.
 Aquilegiæ.
 Asparagi.
 Atriplicis.
 Bardanæ.
 Berberis.
 Bombacis.
 Cannabis.
 Cardamomi minoris.
 Carduibenedicti.
 Carui.
 Caulium.
 Ciceres rubri.
 Citri.
 Citrulli.
 Cnici seu Carthami.
 Coriandri.
 Cubebæ.
 Cucumeris.
 Cucurbitæ.
 Cumini.
 Cydoniorum.

Dactylorum ossa.

Dauci cretici.

Vulgaris.

Endiviæ.

Eruçæ.

Fœniculi.

Fœnugræci.

Fumariæ.

Genistæ.

Grana paradisi.

Hordeum integrum.

mundatum.

perlatum.

Hyperici.

Hyoscyami albi.

Lactucæ.

Levisticæ.

Lini.

Lupini.

Malvæ.

Melonum.

Milii folis.

Napi *sive* Buniadis.

Nasturtii.

Nigellæ.

Nuclei cerasorum.

persicorum.

Ocymi.

Orobi.

Pæoniæ.

Papaveris albi.

nigri.

Petrosel. Vulgaris.

Macedon.

Plan.

Plantaginis.

Portulacæ.

Pſyllii.

Raphani.

Rufci.

Rutæ.

Santonici.

Saxifragiæ.

Scariolæ.

Sefelios maſſilienſis.

Sileris montani.

Sinapi.

Sophiæ.

Staphidis agriæ.

Sumach.

Thlaſpious.

Urticæ.

*Fruetus.***A**lkekengiſeu Ha-
licacabi.Amigdalæ amaræ.
dulces.

Baccæ juniperi.

lauri.

myrthi.

ſambuci.

Berberis.

Capita papaveris.

Carpoballſamum.

Caryophylli.

Caſſia fiſtularis.

Colocynthis.

Daſtili.

Ficus.

Gallæ.

Glandes.

Jujubæ.

Kermes grana ſive

Coccus Baphica.

Myrobal. belliricæ.

Chebulæ.

Citrinæ.

Emblicæ.

Indæ.

Myrtilli.

Nuces cupreſſi.

Moſchatæ.

Piſtachiæ.

Vomicæ.

Paſſulæ majores.

minores.

Piper album.

longum.

nigrum.

Pruna.

Sebeſten.

Siliquæ dulces.

Tamarindi.

*Farinæ.***A**Mylum.

Fabarum.

Fœnugræci.

Hordei.

Lupinorum.

Radi-

Radicum althææ.
 Consolidæ majoris.
 Seminum lini.
 Volatilis.

Succi liquidi.

A Grestæ seu om-
 phacium.
 Berberorum.
 Cydoneorum.
 Granatorum acid.
 Limonum.

Succi condensati, Gummi, & Resinæ.

A cacia vera.
 Aloe Hepatica.
 Succotrina.
 Ammoniacum.
 Assa foetida.
 Balsamum peruvia-
 num.
 Bdellium.
 Benzoinum.
 Bitumen Judaicum.
 Caphura.
 Celophonia.
 Elaterium.
 Eupatorii mesue
 succus.

Euphorbium.
 Galbanum.
 Ghittajemou *seu*
 gutta gamandra.
 Glycyrrizæ succus.
 Gummi arabicum.

Caranna.
 Ceraforum.
 Elemmi.
 Juniperinū.
 Tacamah-
 ca.

Hypocistidis succus.
 Lacca.

Ladanum.

Liquid-ambar.

Manna.

Mastiche.

Myrrha.

Opium.

Opoponax.

Pix.

Resina Abietina.

Laricea.

Pini.

Therebin-
 thina.

Saccharum album.

rubrum.

candum.

Sagapenum.

Sanguis draconis.

Sarcocolla.

Scammonium.

A 4

Styrax

Styrax calamita.
liquida.

Succinum album.
Citrinum.

Tartarum vini albi.

Thus.

Tragacantha.

Animalia, eorum partes & excrementa.

A Deps anferis.
canis.
cervi.
felis.
hominis.

Afelli.

Axungia porci.

Bezoar occidentalis
orientalis.

Cancrorum fluvialium oculi.

Cantharides.

Castoreum.

Cera alba.

flava.

Cornu cervi.

Cranium humanum

Ebur.

Hirci sanguis præpar.

Ichthyocolla.

Mandibulæ Iucii
piscis.

Mel.

Moschus.

Mumia.

Os è corde cervi.

Sanguifugæ.

Scincus.

Sepiæ os.

Sevum hircinum.

Sperma ceti.

Spodium ex ebore.

Ungula Alcis.

Unicornu.

Zibettum.

Mineralia, Metalla, & Lapides.

A Labastrum.

Ærugo.

Æs ustum.

Alumen rupeum.

plumeum.

ustum.

Antimonium.

Argentū foliaceum.

vivum.

Arsenicum.

Auri pigmentum.

Aurum foliaceum.

Bolus armenus.

albus.

vulgaris.

Borax

Borax.	Sal armoniacus.
Calx viva.	Gemmæ.
Cerussa.	Petræ <i>sive</i> Nitrum.
Chalcitis.	Sapphyrus.
Chalybs.	Sardus.
Chryfocolla.	Smaragdus.
Cinnabaris.	Sulphur.
Cryſtallus.	Terra lemnia.
Granatus.	Tuthia officinarum.
Hyacinthus.	Vitriolum album.
Lapis armenius.	Cypreum.
calaminaris.	Viride.
hæmatites.	Vitrum antimonii.
judaicus.	<i>Marina.</i>
lazuli.	A mbra grisea.
Lithargyrus argenti.	Corall. alb.
auri.	rubr.
Magnes.	Corallina.
Minium.	Margaritæ.
Oſteocolla.	Pumex.
Plumbum uſtum.	Spongia.
Pompholyx.	
Rubinus.	

De quibusdam nuncupationibus plura
uno titulo comprehendentibus.

Quinque Radices Aperientes.

Apii.
Asparagi.
Fœniculi.

Pro-

Petroselin.

Rusci.

Quatuor Herbæ Emollientes.

Althæa.

Beta, *vel* Parietaria.

Malva.

Violaria.

Quinque Herbæ Capillares.

Capillus Veneris.

Phillyris, *seu* Lingua cervina.Polytrichum, *seu* Trichomanes.

Ruta muraria.

Scolopendrium, *seu* Ceterach.*Tres Flores Cordiales.*

Borraginis.

Buglossæ.

Violarum.

Quatuor Semina Calida Majora.

Anisi.

Cardamomi.

Cumini.

Fœniculi.

Quatuor Semina Calida Minora.

Ammios.

Apii.

Carui.

Dauci.

Quatuor Semina Frigida Majora.

Cucumeris.
 Cucurbitæ.
 Citrulli.
 Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorei.
 Endiviæ.
 Lactucæ.
 Portulacæ.

*Quinque Lapidum Pretiosorum
Fragmenta.*

Granati.
 Hyacinthi.
 Sapphiri.
 Sardi, seu Carneoli.
 Smaragdi.

*De quorundam simplicium
Collectione.*

Radices evellendæ sunt, quandò nec nimis molles, nec nimis duræ, nec lignosæ.

Herbæ colligendæ sunt, quando folia magnitudine, colore, & odore vigent; idque cælo sereno, & tempore meridiano.

Flores decerpendi sunt in vigore suæ maturitatis; non dehiscentes, aut decidui.
 Flo-


Flores rosarum ante apertionem avellantur, quando conserva ex iis conficienda.

Fructus priusquam decerpantur, justam maturitatem habeant; nisi datâ operâ immaturi desiderentur, ut Mespila, Sorbi &c. Deinde exsiccandi sunt in aëre vel sole; & si opus sit, in clibano post panis exemptionem. Quod si unâ vice exsiccati non sint, postridie denuo immittantur.

Semina colligantur, quando sunt matura, & fructus, quibus includuntur, justam maturitatem cœperunt. Et in loco sicco, non calido, ad usum servantur.

Cortices sunt avellendi, quando arbores in pleno vigore sunt. Crassiores manu avellantur, si leviter adhæreant: sin tenacius ferro abscindantur. Tenues verò & membranosi, ut Sambuci, Fraxini, &c. cultello abradantur.





CLASSIS SECUNDA.

De Aquis Simplicibus, Compositis, Spiritibus, Tincturis, Acetis, & Decoctis.

Aquæ Simples stillatitiæ.

A *Rthemisiæ.*
Borraginis.
Cardui benedicti.

Chicorei.

Fœniculi.

Florum Liliorum convallium.

Rosarum.

Sambuci.

Tiliæ.

Melissæ.

Menthæ.

Plantaginis.

Primulæ Veris.

Salviæ.

Scordii. &c.

Omnes hæ affusâ s. q. aquæ communis post debitam digestionem cum s. q. tartari factam. Per Vesicam destillantur.

Aquæ Cerasorum nigrorum.

Cocleariæ.

Spermatis ranarum.

Per sē s. a. in B. M. ex alembico vitreo destillari debent.

Aqua

Aqua Mellis.

℞. *Mellis q. s.*

Ut decima pars cucurbitæ repleatur cum vitreo Alembico & in B. bulliente destilletur aqua : cum autem guttæ incipiunt accescere vase arenæ imposito, igne aucto liquor secundus & tertius extrahatur.

DE AQUIS COMPOSITIS.

Aqua Anti-Scorbutica.

℞. *Rad. Raphani sylv.**Herb. Cochleariæ.**Nasturtii aq. an. lib. I.**Beccab.**Trifolii aq. an. lib. s.*

Contusis affunde

*Vini albi lib. VIII.**Spirit. Vini lib. II.*

Et sine præviâ fermentatione destill. f. a. ad lib. vii.

Aqua Catharralis.

℞. *Florum Salviæ.**Rorismar.**Lavendulæ recent. sed modice siccata.**Garyophyll.**Nucis mosch.**Cinnam. acuti an. Unc. II.**Gran. Paradisi.**Macis.**Rad. Zedoariæ.**Sem. Coriandri.**Piperis*

Piperis longi.

nigri an. Unc. I.

Fol. Ruthæ.

Absinthij recent. sed modice sicc. an. dr. II.

Pomum aurantium incisum. unum

contusis contundendis infunde per plures
dies in

Vini Rhenani lib. VIII.

Vini Hispan. lib. IV.

& per refrigeratorium destillentur.

Aqua Cinnamomi.

℞. Cinnamomi electi & contusi lib. β.

Vini albi generosi lib. IV.

Tartari crudi Unc. II.

Macerentur per dies aliquot in loco tepido postea additâ.

Aquæ Melissæ lib. I.

destill. f. a. in arenâ.

Aqua Embryonum.

℞. Nucis mosch. Unc. III. β.

Macis Unc. I. β.

Garyophill.

Cinnam. acuti.

Zinziberis.

Cubebæ.

Gran. Paradisi.

Zedoariæ an. Unc. II.

Galangæ drach. VI.

Croci orient. Unc. β.

Flor. Tunicæ.

Tiliæ an. recent. lib. I.

Herb.

Herb. Salviæ cum flor. .

Carui.

Fœniculi.

Verbenæ.

Flor. Lavendulæ an. recent. Unc. III.

Rad. Pæoniæ maris.

Sem. ejusdem.

Visci quercini veri an. Unc. II.

Incisa & contusa crassiuscule infunde in

Vini Canarini lib. XII.

Aquæ Lilior. convall. sine additione aquæ.

Simpl. in B. M. destillatæ.

Spirit. Fragrorum an. lib. I. β.

Aquæ Salviæ.

*Fœniculi sine addit. aq simpl. destill.
an. lib. I.*

Stent in infusione loco tepido per mensem.
Postea destill. in B. M. ad medias.

Aqua Epileptica.

℞. Florum Lilior. convall. m. X.

Tiliæ m. IV.

Vini Hispan. lib. VIII.

Fiat infusio per dies aliquot mox destill. in
balneo quo usque flores in fundo cucurbitæ
tere aridi relinquuntur deinde.

℞: Cinnam. acuti drach. VI.

Nucis mosch. Unc. β.

Piperis longi.

Cubeb. an. drach II.

Flor. Lavendulæ Unc. I. β.

Rorismar.

Stæchad. an. drach. VI.

Visci quercini veri.

Rad.

Rad. Pæoniæ.

Dictamni nost. an. Unc. β.

Omnia crassiuscule contrita rursus in superiori Vino per dies octo macerentur postmodum destill. f. 2. ad medias.

Aqua Hysterica.

℞. *Rad. Bryoniæ Siccæ.*

Baccar. Sambuci matur. lento furni calore exsicc. & à stipit. mundat. an. Unc. II.

Fol. Arthem.

Dictam. Cret.

Matricariæ.

Nepetæ.

Ocymi.

Pulegij.

Ruthæ.

Sabinæ an. Unc. β.

Cortic. aurant. exter. siccæ. Unc. I. β.

Myrrhæ.

Castorei an. drach. III.

Croci drach. I.

Pulverisata macerent. per oſtiduum in
Spirit. Vini depblegmati lib. IV.

Deinde colentur per setaceum densissimum.

Aqua Prophylactica.

℞. *Rad. Angelicæ.*

Zedoar. an. Unc. I.

Petasitid. Unc. II.

Fol. Rutæ Hortens. Unc. IV.

Melissæ.

Scabiosæ.

Flor. Calendule an. Unc. II.

Nucum Jugland. immatur. concis. lib. II.

Pomor. Citrior. concis. recent. lib. I.

Contufis affunde

Aceti Vini deftillati lib. XII.

Digerantur per noctem mane deftill. igne cinerum lento penè ad ficcitatem idque fine uftione.

Aqua Theriacalis Simplex.

℞. Theriacæ recent. Unc. IV.

Spirit. Vini dephlegmati Unc. XX.

Digerantur fimul per tres dies in B.M. dein clarum à fpiffo per decantationem fepara.

Aqua Vitæ compof.

℞. Cinnamomi acuti drach. VI.

Nucis mofc. Unc. β.

Garyophill.

Rad. Zedoariæ

Zinziberis

Cubebar.

Cardamom. minor

Ligni Santal. rubri

Spicæ nardi

Stæchad. Arab. an drach. I.

Rad. Galang. drach. β.

Fol. Rorifmar.

Majoranæ ficcāt. an. fcrup. II.

Cortic. Aurant. ficcāt. drach. II. β.

Flor. Rosar. rubr.

Lavendulæ

Anthos an. drach. III.

Contufis contund. affunde

Spirit.

Spirit. Vini dephlegmati lib. IV.

Digere leni calore per dies aliquot & postea liquor decantetur.

Aqua Vitæ Aulica.

℞. *Rad. Enulæ Camp. Unc. III.*

Galangæ

Anisorum an. Unc. I. β.

Croci drach. III.

Calaminthæ m. II. β.

Pulegij

Dictamni Cretici

Majoranæ

Arthemisiæ

Agrimoniæ an. m. I. β.

Garyophyllorum drach. III.

Incidenda incidantur & terenda terantur deinde affunde

Spiritus Vini optimi lib. VI.

Destill. per alembicum Vitreum destillatis adde

Aque Melissæ Unc. IX.

Cinnamomi Unc. VII.

Sacchari albi lib. β.

In vase optime clauso fervetur ad usum.

Spiritus Carminativus.

℞. *Rad. Angelicæ drach. I.*

Imperat.

Galangæ an. drach. I. β.

Fol. Rorismar.

Majoranæ

Ruthæ Hortensis

Basiliconis

Summit. Centaurii minoris an. m. ℥.

Baccar. Lauri drach. III.

Semin. Angelicæ

Levistici

Anisi an. Unc. ℥.

Zinziberis

Nucis moscb.

Maceris an. drach. I. ℥.

Cinnam. acuti drach VI.

Garyophill.

Corticum Aurant. siccāt. an. drach. I.

Spirit. Vini Unc. XXXX.

Digerantur simul & postea f. a. destillentur.

Aqua seu Elixir antifebrile.

℞. *Garyophill. Unc. IV.*

Mithridatii Unc. III.

Spiritus Vini lib. VI.

Digerantur simul calide per dies aliquot
postea liquor filtretur cui adde

Camphoræ Unc. II. ℥.

Olei Juniperi drach. VI.

Sal. Volatil. C. C. Unc. ℥.

Et circulando in calore leni fiat exacta
mixtio & dissolutio.

Spiritus Aromaticus Oleosus

Seu

Sal Volatile Oleosum.

℞. *Foliorum Majoranæ*

Menthæ

Salviæ siccāt. an. drach. VI.

Florum Lavendulæ drach. III.

Cortic. exterior Citri

Aurant. an. Unc. II.

Cinnamomi acuti Unc. I. β.

Nucis moschatæ

Maceris an. drach. VI.

Garyophyllor. Unc. β.

Sem. Cardamomi min.

Carui an. drach. II.

Salis Tartari

Armoniacci an. Unc. IV.

Spiritus Vini lib. IV.

F. infusio per dies aliquot & destillentur ex arenâ s. a.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞. *Spiritus Vini dephlegmati lib. I.*

Camphoræ Unc. I.

Misce simul.

Spiritus Vini Rectificatus.

℞. *Spiritus Vini q. v.*

Destilletur per Alemb. in B. M. quod toties repetatur donec pulverem tormentarium accendere possit.

Spiritus Ardentes.

Cochleariæ

Menthæ

Melissæ

Baccar. Sambuci

Juniperi

Cerasor. nigror.

Fragorum &c.

℞. *Fol. aut Fructuum supradict. q. v.*

Ferment. & destill. s. a. quæ postea debite rectific.

D E T I N C T U R I S.

Tinctura Croci.

℞. *Croci Unc. I.**Spiritus Vini rectif. lib. ℥.*

Extrahatur f. a. Tinctura.

Tinctura Cinnamomi.

℞. *Cinnamomi optimi Unc. II.**Spiritus Vini rectif. Unc. VIII.*

Extrah. f. a. Tinctura.

Tinctura Castorei.

℞. *Castorei pulveris Unc. I.**Spiritus Vini rectific. Unc. VIII.**Salis Tartari drach. I.*

Digerantur per sex dies & demum filtrando clarum à spisso separa.

Tinctura Gummi Laccæ.

℞. *Gummi Laccæ Unc. ℥.**Aluminis usti drach. I.**Spiritus Cochleariæ ultimo extillantis
Unc. VIII.*

Phialæ arcte inclusa digerantur in arenâ donec tinctura satis rubicunda appareat quæ leniter effundatur.

Tinctura Opii.

Seu

Laudanum liquidum Tartarifatum.

℞. *Opii Thebaici Unc. I.**Croci drach. II.**Cinnamomi*

*Garyophill.**Macis**Nucis moschatae an drach. β.**Salis Tartari drach. I.**Spiritus Vini rectificati lib. I.*

Digerantur per dies aliquot postea liquor
filtretur & ad dimidium exhaletur.

Tinctura Salis Tartari.

℞. *Salis Tartaris Unc. VI.*

Calcinetur violento igne donec ceruleus evadat quod fit spatio trium vel quatuor horarum. Ferè refrigeratum crucibulum frangatur. Massa exempta teratur. Huic pulveri adhuc calenti superfunde alcohol Vini ad supereminentiam duorum vel trium digitorum digerantur simul donec colore rubro tinctus appareat spiritus quem effunde & separa.

Tinctura Succini.

℞. *Succini flavi & in pollinem redacti Unc. IV*
Spirit. Vini rectific. lib. I.

Digerantur simul per dies aliquot ad Succini solutionem deinde decant. filtret. & tertiam partem. in B. M. abstrahatur.

Elixir proprietatis.

℞. *Myrrhæ electæ.*

*Aloes lucidæ**Croci an. Unc. I.*

Affunde liquorem nitri fixi ad madefactionem digerantur simul per dies aliquot in B. M. postea adde

Alcohol Vini Unc. X.

Tincturam per dies duodecim digerendo & circulando extrahe quam postea decanta.

Præparatur etiam alio modo hoc Elixir humectando species supradictas spiritu Vini alcoholisato & addendo spiritus sulphuris per campanam q. f. procedendo ut supra.

DE ACETIS.

Acetum Calendule

Rosarum rubrarum

Sambuci &c.

Fiunt eodem modo

℞. Florum Siccatur. lib. β.

Aceti Vini acerrimi lib. IV.

Insolentur æstivis caloribus in vase vitreo optime clauso dein abjectis floribus Acetum reponatur.

Acetum Stillatitium.

℞. Aceti vini acerrimi q. v.

Destilletur ex Cucurbitâ vitreâ in B. M. vel cineribus lenissimo calore, primò ascendit phlegma, ferè ad quartam partem liquoris, quod extillavisse cognosces acido odore & sapore. Tum mutare recipiens, & collige Acetum destillatum, continua destillationem, donec spiritus omnes ascenderint.

Acetum Scylliticum.

℞. Tunicarum Scyllæ leviter exsiccatur. Unc. IV

Aceti Vini lib. IV.

Misce

Misce in vase vitreo benè clauso & insolentur æstivis caloribus.

Acetum Theriacale.

℞. *Rad. Petasitidis* Unc. III.

Scorzoneræ,

Angelicæ,

Zedoariæ,

Succisæ an. Unc. II.

Herb. Petroselinæ Macedonici,

Scordii,

Galegæ,

Ruthæ hortensis ana Unc. I. β.

Baccarum Juniperi,

Herbæ Paridis ana Unc. I.

Cortic. Citri exteriorum Unc. III.

Flor. Calendulæ siccatorum Unc. β.

Croci Orientalis drach. II.

Mirrhe electæ,

Cinnamomi optimi ana Unc. II.

Macis Unc. I. β.

Theriace Andromachi Unc. II.

Incisa & contusa immittantur vasi vitreo;
quibus super affunde

Aceti vini acerrimi lib. X.

Et vase rectè obturato, ferventur ad usum.

Acetis subungi possunt, *Oxycratum*, seu
Posca, & *Oxyrhodinum*.

Oxycratum constat parte unâ aceti, &
sex aquæ.

Oxyrhodinum paratur ex parte unâ Aceti
rosati, & tribus partibus Olei rosati.

D E D E C O C T I S.

Decoctum Hordei.

℞. *Hordei mundati Unc. II.**Aquæ communis lib. XII.*

Coque ad tertiæ partis consumptionem.

Cremor Hordei.

℞. *Hordei perlati Unc. II.**Aquæ communis q. s.*

Decoque igne lento, donec ferveſcant, tum abjectâ priori aquâ, nova addatur, coquendo per quatuor vel quinque horas: deinde trajiciatur per ſetaceum, trajecto adde ſacchari albi, & aquæ Roſarum ana quantum ſatis.

Hordeatum Amygdalinum.

℞. *Decocti Hordei Unc. X.**Amygdalarum dulcium per aquam ferventem mundatarum Unc. β.*

Piſtentur in mortario marmoreo, & addita ſacchari albi & aquæ Roſarum quantitate ſufficiente, f. Hordeatum Amygdalinum.

Simili modo fiunt emulſiones ex ſeminibus frigidis majoribus, f. a. mundatis.

Ptifana Communis.

℞. *Hordei integri Unc. I. β.**Aquæ communis lib. VIII.*

Coque ad medias ſub finem adde

Liquiritiæ raſæ drach. IV.

Anisorum drach. I.

Fiet Passulata si inter coquendum addatur passularum mundatarum Unc. I. β .

Decoctum Cordiale, Medecinæ.

- \mathcal{R} . *Hordei mundati pug. I.*
Pruna Damascena Num. IV.
Uvarum passarum exacinatarum Unc. β .
Glycyrrhizæ rasæ drach. I. β .
Flor. Borraginis,
Buglossi,
Violarum ana pug. I.
Anisorum drach. I.
Aquæ fontis lib. III.

Decoque s. a. ad tertiæ partis consumptionem, colatura fervetur ad usum.

Decoctum solutivum.

- \mathcal{R} . *Superioris colaturæ lib. I.*
Fol. Sennæ mundatorum drach. VI.
Anisorum contusorum drach. II.
 Effervescent leviter, & sine colatura ferventur ad usum.

Decoctum Pectorale.

- \mathcal{R} . *Hordei mundati Unc. β .*
Uvarum passarum enucleatarum drac. VI.
Sebesten,
Jujubas ana Num. X.
Dactylos Num. VI.
Caricas pingues Num. IV.
Rutæ murariæ,
Scabiosæ,
Tussilaginis ana m. β .

Hyssopi

*Hyssopi pug. I.**Glycyrrhizæ rasæ drach. II.*

Coquantur in lib. VIII. aquæ fontis, ad medias.

Decoctum Clysteris Emolliens.

*℞. Fol. Malvæ,**Althææ,**Violaris,**Betæ,**Mercurialis an. m. I.*

Coquantur s. a. in sufficienti quantitate aquæ communis ad libras duas, colatura fervetur ad usum, herbæ sint semper recentes, si fieri possit.

Decoctum Carminativum.

*℞. Herb. Origani,**Pulegii,**Summitatum Thymi an. m. β.**Semen Anisi,**Carui,**Cumini,**Fœniculi an. drach. III.**Flor. Chamomæli,**Summitatum Anethi an. m. β.**Uvarum passarum exacinatarum**Unc. I.*

Bulliant leviter in aquæ lib. III. colatura fervetur usui.

Decoctum Nephriticum.

*℞. Rad. Ervngii,**Ononidis an. Unc. β.**Hordei*

Hordei mundaati Unc. II.

Cicerum rubrorum Unc. III.

Caricas pingues Num. IX.

Sebesten Num. VII.

Glycyrrhizæ rasæ drach. VI.

Sem.n. Malvæ,

Althææ an. drach. III.

Quatuor frigidorum majorum an. drac. II.

Coquantur in aquæ fontis libris decem,
ad libras sex.

Decoctum Vulnerale.

℞. Rad. Consolidæ majoris siccæ.

Alkannæ. i. Anchusæ,

Tussilaginis,

Rubiæ tinctorum an. drach. III.

Fol. Melissæ,

Millefolii,

Saniculæ,

Pyrolæ,

Betonicæ,

Agrimoniæ,

Bugulæ,


Alc'imillæ,

Veronicæ an. m. ℞.

Oculorum Cancri contusorum Unc. II.

Spermatis cæti drach. I.

Bulliant in sufficiente quantitate aquæ ad
libras sex, addendo sub finem vini Rhe-
nani libras duas.



CLASSIS TERTIA.

De Syrupis, Mellitis & Looch.

Syrupus hederæ terrestris.

℞. *Succi hederæ terrestris depurati lib. VI.*
Sacchari albissimi lib. IV.

Clarific. album. Ovor. & f. f. a. Syrupus.
 Eodem modo fiunt Syrupi.

Ex Succis { *Borraginis,*
 Gkicorei,
 Endivia,
 Rubi Idæi,
 Scabiosæ,
 Tussilaginis &c.

Similiter ex Succis non acidis.

Syrupus ex succo Limonum.

℞. *Succi Limonum recent. Express. & per*
subsidentiam depurati lib. I.
Sacch. Albiss. clarific. & ad consistent. cocti
lib. II.

Misceantur f. a. in vase fictili & f. Syrupus.
 Simili ferè modo conficiuntur Syrupi.

Ex Succis { *Agrestæ,*
 Aurantiorum,
 Berberis.
 Granator. acidor.
 dulcium,
 Ribesiorum &c.

Et

Et ex reliquis succis Acidis clarific. alios plus, alias minus, alios non coquendo pro naturâ acedinis quod artifici relinquimus.

Syrupus de Absynthio.

℞. *Absynthii vulg. lib. β.*

Rosar. rubr. Unc. II.

Spicæ Indicæ drach. III.

Vini veteris optimi.

Succi Cydoniorum an. lib. III. β.

Incisis incidend. immitantur, cucurbitæ quibus affund. vinum & succus cydon. fiat per horas 24. in arenâ maceratio tum igne aucto ac apposito capitello f. destill. liquoris spirituosus ad Unc. X. circiter, qui asservetur. Refrigeratâ Cucurbitâ species in fundo relictæ exprimantur. Expressum album. ovi clarific. cum

Sacchari albi lib. II.

Coq. ad Syrupi consist. crassior. cui demum sola dissolutione admisce liquorem spirituosorem reservatum & f. f. a. Syrupus.

Syrupus de Althæâ.

℞. *Rad. Althææ recentium Unc. II.*

Cicerum rubrorum Unc. I.

Rad. Graminis,

Asparagi,

Liquiritiæ,

Passularum exacinarum an. Unc. β.

Cymarum Althææ,

Malvæ,

Helxines, sive Parietariæ,

Pimpinellæ minoris,

Plan-

*Plantaginis majoris,**Polytrici,**Rutæ murariæ an. manip. I.**Quatuor seminum frigidorum major.
frigid. minor. an. drach. III.*

Coquantur s. a. in aquæ communis lib.
IX. ad remanentiam lib. VI. colaturæ cla-
rificatæ adde

Sacchari albissimi lib. IV.

Fiat ex arte Syrupus.

Syrupus de Arthemisiâ.

℞. *Rad. Fœniculi,*

*Helenii,**Iridis,**Levistici,**Pæoniæ,**Rubiæ tinct. an. Unc. β.*

Herb. Arthemisiæ m. II.

*Betonicæ,**Calaminthæ,**Chamædrios,**Chamæpiteos,**Hysopi,**Hyperici,**Majoranæ,**Matricariæ,**Melissæ,**Nepetæ,**Origani,**Præssii,**Pulegii,**Sabinæ an. m. I.*

Sem. Anisi,

Dauci

Dauci,
Fœniculi,
Nigellæ,
Ocymi,
Petroselini,
Rutæ an. drach. III.
Cinnamomi Unc. I.
Spicæ Indicæ drach. III

Contund. & incid. grosso modo dein macer. per duos dies in *f. q. Hydromelitis vinosi dilutioris* postea per B. M. separetur aqua spirituosâ quâ seorsim exceptâ reliquiæ ulterius coquantur s. a. colatura cum

Sacchari lib. V.

percoquantur in Syrupum crassum ut postea permisceri queat aquæ spirituosæ asseruatæ.

Syrupus Capillorum Veneris.

℞. Capillorum Veneris, vel ejus defectu Rutæ murariæ m. III.

Polytrici aurei, vel ejus loco Trichomanes,
Saxifragiæ,
Betoniciæ,
Pimpinellæ,
Asplenii an. m. II.

Coquantur ex aquæ fontis lib. VIII. donec ad quinque redeant, in expresso clarificato dissolve.

Sacchari albissimi lib. III. β.

Mellis optimi depurati lib. β.

Fiat s. a. Syrupus.

Notandum hîc, ut etiam ubicumque requiritur Ruta muraria, vel Polytricum,

C

herbam

herbam semper recentem intelligi, aliàs ea non præstat, quæ intendit Medicus.

Syrupus de Chicoreo compositus.

℞. *Hordei integri*,

Rad. Apii,

Fœniculi,

Asparagi an. Unc. II.

Herb. Cichorii m. III.

Endiviæ domesticæ,

silvestris,

Taraxaci an. m. II.

Cicerbitæ,

Fumariæ,

Polytrici,

Asplenii,

Salviæ vitæ,

Summitatum Lupulorum an. m. I.

Fruetuum recentium Alkekengi,

Radicum Glycyrrhizæ an. drach. VI.

Aquæ fontis lib. XII.

Coquantur ordine debito ad lib. VIII. in colatura clarificata dissolve

Sacchari albissimi lib. VI.

Percoquantur s. a. in Syrupum.

Syrupus de Cortice citri.

℞. *Cortic. exterior citri recent. Unc. X.*

Gran. Kermes drach. II.

Aq. fontis lib. VI.

Infunde per noctem & postea per B. M. separetur aqua spirituosâ ad Unc. X. quâ seorsim exceptâ reliquiæ ulterius coquantur ad lib. III. colatura cum

Sac-

Sacchari albiſſimi lib. II. clarificata.

Coque in Syrupum craſſum cui poſtea
admiſceatur aqua ſpirituosa.

Syrupus de Eryſimo.

℞. *Fol. Eryſimi recent. m. VI*

Rad. Helenii,

Tuſſilag.

Liquirit.

Paſſular. exacin.

Hordei integri an. Unc. II.

Herb. Borrág.

Chicorei,

Capill. Ven. an. m. I. ſ.

Flor. Trium Cordial.

Anthos,

Stæchados an. m. ſ.

Sem. Aniſi drach VI.

Incifa & contuſa coque ſ. a. ex aquæ lib.

VIII. ad medias colat. Expreſſ. adde

Succi Eryſimi clarific. Unc. VIII.

Sacch. albi lib. III.

Mellis deſpumati lib. I.

F. ſ. a. Syrupus.

Syrupus de Hyſopo.

℞. *Aquæ fontanæ lib. VIII.*

Hordei mundati Unc. ſ.

Coquantur circiter per mediam horam,
deinde injiciantur

Rad. Apii,

Petroſelini,

Fœniculi,

Glycyrrhizæ incifarum an. drach. X.

Jujubarum,

Sebesten an. Paria XV.

Passularum mundatarum Unc. I. β.

Caric. ping.

Dactyl. ping. an. N. X.

Semin. Malvæ,

Cydoniorum,

Gummi Tragacanthi linteo raro inclusorum an. drach. III.

Hyssopi mediocriter siccae drach. X.

Capillorum Veneris drach. VI.

Elixentur simul, sic tamen, ut quadrantis horæ intervallo radices fructus, fructus semina, semina herbas præcedant: tandem quinque libris aquæ desideratis aut absumptis, adde reliquis tribus colatis prius & clarificatis

Sacchari albissimi lib. II. β.

Et percoque in Syrupum, ut artis est.

Syrupus de Menthâ.

℞. *Succi Cydonior.*

Vini albi an. lib. I. β.

Menthæ siccae lib. β.

Rosar. rubr. Unc. I. β.

Nucis moschatae drach. III.

Cinnamomi Unc. β.

Mastich. drach. II.

Infund & diger. ex arenâ in cucurb. terrea vel vitrea deinde destill. per alemb. Vitreum aqua spirituosa ad Unc. X. quæ seorsim asservetur deinde post alteram ebullitionem colatura Exprim. quæ decantatâ cum

Sacch.

Sacch. lib. III.

Coq. in Syrup. crassiorē cui demūm
admisce aquā spirituos. asservatam &
sola dissolutione f. Syrupus.

Syrupus Myrtinus.

℞. *Baccarum Myrti Unc. II. β.*

Rosarum rubrarum,

Santali albi,

rubri,

Sumach,

Balaustiorum,

Berberorum an. drach. XV.

Mespilorum immaturorum lib. β.

Coquantur in aquæ fontis lib. VIII. ad
dimidias, colentur, & cum

Sacchari albissimi lib. III.

Et in fine

Succorum Granatorum,

Cydoniorum depuratorum an. lib. β.

F. f. a. Syrupus.

Syrupus Papaveris albi.

℞. *Capitum Papaveris albi recentium &
maturorum lib. I.*

Infunde per diem & noctem in aquæ plu-
vialis lib. IV. Coquantur, donec macres-
cant & fortiter exprimantur, expresso adde

Sacchari albissimi,

Penidiorum an. lib. I.

Coque lento igne in Syrupum, cavendo
unicè ne mucillagineum evadat decoctum,
quale *Capita Papaveris* etiam præbere so-
lent, si diu coquantur,

Syrupus Papaveris Erratici.

℞. *Florum Papaveris Erratici lib. β.*

Infunde per noctem in aquæ fontis calentis lib. II. infusio tertio reiteretur, tum adde

Sacch. albissimi cum dicta infus. clarif. lib. I. β.

Coquantur in Syrupum s. a. Eodem modo fit Syrupus florum *Chamomillæ*, tum etiam ex partibus albissimis florum *Nymphææ*, repetitis ut dictum est, trinis infusionibus.

Syrupus de Pæonia.

℞. *Rad. Pæoniæ maris Unc. II.*

Nucleorum seminis ejusdem,

Visci quercini veri an. Unc. I.

Herb. Bêtonicæ,

Primulæ veris,

Verbenæ an. m. I.

Flor. Rorismarini,

Stæchados,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Tiliæ recentium an. pug. I.

Decoquantur s. a. in aquæ fontis lib. VI. ad dimidias colaturæ fortiter expressæ adde

Sacchari albissimi lib. II.

Fiat ex arte Syrupus.

Syrupus de quinque Radicibus.

℞. *Rad. Apii,*

Fœniculi,

Petroselinii,

Rusci,

*Rusci,**Asparagi an. Unc. II.**Aquæ fontis lib. VI.*Elixando evaporet pars tertia, ex reliquo
cum*Sacchari albissimi lib. III.**Aceti vini albi Unc. VIII.*

Sub finem affusis, conficiatur Syrupus f. a.

Syrupus de Rosis ficcis.

*R. Rosarum rubrarum siccatarum lib. I.*Infundantur in aquæ calentis puræ lib.
X. horis 24. infusionem hanc (reaf-
sumptis semper novis Rosis) triplicando:
tandem in expressione dilue*Sacchari albissimi lib. IV.*

Coque ex arte in Syrupum.

Syrupus de Scordio.

*R. Rad. Scorzonera recentium Unc. II. β.**Fol. Scordii recentium m. IV.**Ulmariæ recentium m. II. β.**Sonchi levis,**Endiviæ,**Borraginis,**Acetosæ,**Scorzonera,**Flor. Nymphaeæ recentium an. m. I.**Cordialium an. pug. I.*Coquantur f. a. in aquæ Hordei integri
lib. VI. ad mediæ partis consumptionem,
colaturæ clarificatæ adde*Sacchari albissimi lib. II.*

Coquantur in Syrupum f. a.

Syrupus de Symphito.

℞. Rad. & Cymarum Symphiti majoris &
minoris an. m. VI.

Fol. Betonicæ,

Plantaginis,

Pimpinellæ,

Polygoni,

Scabiosæ,

Tussilaginis,

Rosarum rubrarum recent. an. m. IV.

Contusis omnibus recentibus adde aq.
comm. lib. IV. colat. fortiter expressa cla-
rific. cum

Sacchari albissimi lib. IV.

Coquatur in Syrupum.

Syrupus de Stœchade.

℞. Flor. Stœchados Arabicæ Unc. IV.

Herb. Betonicæ,

Thymi,

Calaminthæ,

Origani an. Unc. I. β.

Salviæ,

Flor. Rorismar.

Pæoniæ,

Ruthæ,

Cinnamom.

Zinziberis,

Calami Aromat. an. drach. III.

Macerentur simul in f. q. Hydromel.
per 24. horas dein destillationi ut supra
comitt. ut aqua Spirituosa extrahatur
quâ seorsim excepta reliquiæ ulteriùs co-
quantur & cum

Sacchari & Mellis optimi an, lib. II.

F. Syrupus crassus ut postea permisceri queat aquæ Spirituosæ.

Syrupus Violaceus.

℞. *Flor. Violarum à pediculis herbaceis mundatorum lib. I.*

Aquæ fontis ferventis lib. II.

Arctè claude in olla nova vitreata per integrum diem, deinde exprime prælo, in expressi lib. II. dissolve ad Balnei calorem.

Sacchari albißimi lib. IV. & Unc. III.

Spuma emergens auferatur, fiatque sine coctione Syrupus f. a.

Nota, si cum Melle quis Syrupum ex præscripto Medici parare cupiat, is eligat album odoratissimum, quale Hispanum est, aut quod Virgineum vocant: rejiciat verò vulgare illud flatuosum.

Syrupus de Chicoreo cum Rheo.

℞. *Rhabarb. incisi Unc. I.*

Cinnamomi,

Schœnanti an. drach. β.

Infunde calide in aquæ Chicorei destill. Unc. IX. colat. expressa asservetur tum residuo affund.

Decocti Syrupi de Chicor. compos. lib. I. β.

Coq. unâ aut alterâ ebullit. colat. Expressa cum

Sacch. lib. I. clarific.

Percoq. in Syrup. crassior. cui admisce superiorem Tincturam asservatam & solâ dissolut. f. f. a. Syrupus.

Syrupus.

Syrupus Florum Persicorum.

℞. *Florum Persicorum recentium lib. I.*

Macerentur per 24. horas in aquæ calentis lib. III. expresso postmodum & colato liquori parem florum recentium quantitatem infunde, idque quinies iteretur: postremæ colaturæ accipe lib. III.

Sacchari albißimi lib. II. β.

F. f. a. Syrupus.

Syrupus de Polipodio.

℞. *Rad. Polipodii quercini recentis lib. I.*

Incidatur infundaturque horis 24. in lib IV. aquæ fontis: deinde bulliant ad consumptionem quartæ partis, ac in fine adde

Rad. Acori veri Unc. I.

Sem. Fœniculi drach. III.

Iterum leniter bulliant, ac decocto hujus colato adde.

Infusionis Rosarum solutiæ lib. I. β.

Succorum depuratorum Borraginis,

Fumariæ,

Lupuli an. Unc. VI.

In his succis & liquoribus coque

Myrobalanorum Citrinorum,

Chebulorum,

Indorum an. Unc. I. β.

Passularum minorum Unc. III.

Bulliant simul ad consumptionem tertiæ partis, in fine addendo

Fol. Sennæ Orientalis mundatorum Unc. VI

Sem. Fœniculi dulcis Unc. I.

Infun.

Infunde per noctem, postmodum exprimantur, & colentur, ac colatura cum
Sacchari lib. III.

Coquatur in Syrupum, usui reponendum.

Syrupus de Rhamno Cathartico.

℞. *Baccarum, fruticis spinæ Cervinæ in principio Octobris collectarum quantitatem sufficientem.*

Contundantur in pilâ lapideâ, deinde exprimendo colentur: succus expressus coquatur lento igne ad quartæ partis consumptionem, tum iterum coletur.

℞. *Hujus Colati lib. II.*

Sacchari albissimi Unc. XVI.

Coquantur simul in Syrupi consistentiam cui tandem admisce elæosaccharum

Sacch. pulveris Unc. β.

Ol. Stillat. Anisi,

Caryophill.

Nucis Moschatæ,

Cinnamomi an. gutt. VI.

Misce f. Syrupus.

Syrupus Regis solutivus.

℞. *Fol. Sennæ mundatorum Unc. II.*

Aquæ Fœniculi lib. II.

Infunde per 24. horas, tum adde

Infusionis Violarum ex quinque infusionibus,

Infus. Rosar. ex novem infus. an. Unc. VIII.

Sacchari albissimi lib. II.

Misce, f. s. a. Syrupus.

Syrupus

Syrupus Rosarum solutivus.

Rx. Rosarum pallidarum recentium, ut decet mundatarum lib. III.

Aquæ fontis lib. XII.

Infundantur per diem naturalem deinde rursus calefactæ exprimantur, iterum in eadem aqua par florum quantitas infundatur & exprimatur, & hoc nonies, ut antè dictum est, reiteretur tum

Rx. Colaturæ præscriptæ partes sex.

Sacchari albissimi partes quatuor.

Clarificentur, & coquantur in Syrupum.

D E M E L L I T I S.

Mellis despumatio.

Rx. Mellis optimi lib. IV.

Aquæ fontis lib. II.

Coque s. a. semper despumando ad aquæ consumptionem.

Hydromel simplex.

Rx. Mellis optimi lib. I.

Aquæ fontis lib. VIII

Decoquantur simul benè despumando, dum ovum recens impositum supernatare queat.

Oxymel simplex.

Rx. Mellis optimi lib. IV.

Aquæ fontis lib. I.

Coquantur simul in vase fictili, semper despumando ad aquæ consumptionem; tum adde

Aceti acerrimi lib. II.

Coque f. a. donec Syrupi liquidioris
consistentiam acquirat.

Oxymel Scylliticum.

R. *Mellis despumati ad consist. cocti lib. III.*
Aceti Scyllitici lib. II.

Misce sine ullâ coctione ad usum.

Oxymel Marrubiatum.

R. *Decocti Marrub. albi.*
Mellis despum. an. lib. I.

Coque in Syrup. crassior. adde
Aceti vini optimi lib. ß.

Mel Mercuriale.

R. *Succi herbæ Mercurialis fœminæ f. a.*
depurati lib. VI.
Mellis depurati lib. IV.

Coque f. a. in Syrupi consistentiam.

Mel Rosarum.

R. *Rosarum rubrarum recentium lib. III.*
Aquæ fontis calentis lib. XII.

Infundantur simul per 24. horas, &
exprimantur, eadem infusio tertio itere-
tur, deindè infusio expressa cum

Mellis depurati lib. X.

Coquatur in Syrupi consistentiam.

Diamorum.

R. *Succi Mororum Batinorum. i. Rubi hu-*
milis immaturorum lib. I. ß.

Succi Mororum Celsi domesticorum ex ar-
bore pendentium non maturorum Unc. IX

Coque

Coque lento igne in vase terreo vitreato ad tertiæ partis consumptionem, & post depurationem adde

Mellis optimi depurati lib. l. ꝑ.

Sapæ Unc. III.

Coque leniter ad Syrupi consistentiam.

LOOCH seu LINCTUS.

Looch sanum & expertum.

℞, Passularum exacinarum,

Caricarum pinguium,

Dactylorum an. Unc. II.

Zizifa,

Sebesten an. Num. XXX.

Radicum Ircos Florentinæ,

Glycyrrhizæ,

Fol. Hysopi,

Calaminthæ,

Polytrici,

Sem. Anisi,

Fœniculi,

Lini,

Cinnamomi an. Unc. ꝑ.

Decoquantur omnia s. a. in aquæ lib. V. ad remanentiam librarum duarum: expressioni adde

Penidiorum lib. II.

Et rursus coquantur ad Mellis consistentiam, tumque adjice minutim contusas

Pinearum purgatarum drach. V.

Amigdalarum dulcium mund. drach. III.

Qui-

Quibus ritè commixtis insperge pulve-
res sequentium

Rad. Glycyrrhizæ rasæ,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,


Amyli an. drach. III.

Rad. Ireos Florentinæ drach. II.

Agitentur omnia simul, donec albes-
cant, & linctus formam nanciscantur.



CLAS-



CLASSIS QUARTA.

*De Rob, Conditis, Conservis,
& Tragematis.*

Parantur hæc eodem modo.

Rob. Berberorum,
Cerasorum nigror.
rubror.
Ribesiorum &c.

R. **S**ucci cujusvis recenter expressi lib. II.
Sacchari albiſſimi depurati lib. I.

Coquantur lento igne in vase fictili donec
Gelatinæ consistentiam acquirant.

Rob Cydoniorum.

℞. Succi Cydoniorum depurati lib. XII.

Coque in vase fictili lento igne ad remanentiam lib. IV. tum adde

Sacchari albissimi depurati lib. IV.

Et repetitâ cocturâ, f. Rob f.a.

Rob Sambuci.

℞. Succi Baccar. Sambuci maturarum q. v.

Inspissetur fensim in vase fictili igne lento, addendo pro quaque librâ succi

Sacchari Unc. III.

Eodem modo paratur *Rob Ebulinum*, *Juniperi*, & *Veronicae*, nisi quod in hoc postremo sacchari & succi tantundem expetatur.

CON.

CONDITA.

Radicum, Caulium, Corticum, Florum, Fructuum, Pulparum.

℞. *Radicum Eryngii q. v.*

Mundentur exterius, coquantur in sufficienti quantitate aquæ ad mollitiem Radicum, in decocto dissolve

Sacchari albissimi pondus æquale.

Et coque ad consistentiam Syrupi crassioris, auferendo spumam, & postquam refrixerit adde Radices, & post aliquot dies decantetur Syrupus, & recoquatur ad debitam Syrupi consistentiam, & Radicibus adde dum adhuc calet; & si superflua sit humiditas etiam tertio Syrupus recoquendus est.

His non multum dissimiliter condiuntur.

Radices	{	<i>Acori vulgaris,</i>
		<i>Angelicæ,</i>
		<i>Borraginis,</i>
		<i>Buglossi,</i>
		<i>Cichorii,</i>
		<i>Enulæ Campanæ,</i>
		<i>Pimpinellæ,</i>
		<i>Satyræ,</i>
		<i>Sisari,</i>
		<i>Symphyti majoris,</i>
		<i>Scorfonæræ, &c.</i>

℞. *Corticum Aurantium recentium q. v.*

Tenuiter aufer interiorem partem albicantem, & in aqua fontana macera, & coque donec leniter mollescant, tum proce-

D

datur

50 P H A R M A C O P O E A
datur ut de *Radicibus Eryngii* dictum est.
Pari modo parantur :

Cortices { *Citrionum* ,
 Limonum , &c.

CONSERVÆ ET SACCHARATA.

Herbarum Absinthii utriusque ,
 Acetosellæ ,
Florum Aurantiorum ,
 Calendulæ ,
 Borraginis ,
 Violarum ,
 Salviæ ,
 Rosarum rubrarum ,
 damascenarum ,
 Rorismarini &c.

Ex his omnibus fiunt Conservæ cum
Sacchari albißimi triplâ proportionem no-
tandum tamen quod humidioribus singulis
libris Sacchari libræ duæ sufficiant.

T R A G E M A T A.

Tabellæ Aromatici Rosati.

℞. *Specierum Aromatici Rosati drach. II.*
 Sacch. albißimi aqua Rosar. soluti Unc. IV.
Misce f. f. a. Tabellæ.

Tabellæ Diacodiſ.

℞. *Seminum Papaveris albi Unc. I.*
 Extrahatur f. a. emulsio cum
 Aquarum Rosarum. &
 Scabiosæ an. Unc. I. ꝑ. cui adde
 Sacchari albi conglobati Unc. IV.
Coque

BRUXELLENSIS. 51.

Coque s. a. continuo movendo ad consistentiam Tabellarum.

Saccharum Perlatum.

℞. Sacchari albissimi lib. I.


Aque Rosarum q. s.

Coquantur in consist. Tabell. sub finem coctionis immiscendo

Margarit. præp. & trit. Unc. β.

F. s. a. Tabellæ.





CLASSIS QUINTA.

De Electuariis Solutivis.

Benedictum Laxativum.

℞. **T** *Urpethi drach. X.*
Radicum Esulæ minoris præparat.
Hermodactylorum,

Diagridii,
Rosarum rubrarum an. drach. V.
Zinziberis,
Galangæ,
Garyophyllorum,
Cardamomi,
Amomi, vel ejus defectu Acori,
Piperis longi,
Macis,
Spicæ Nardi,
Croci Orientalis,
Sem. Apii,
Carui,
Fœniculi,
Saxifragiæ,
Miliæ Solis,
Asparagorum,
Rusci,

Salis Gemmei pulverisatorum an. drach. I.
Mellis despumati lib. I. β.

Fiat *Electuarium* lege artis. Possunt etiam species per se in officinis commodè reservari.

Caryocostinum.

- ℞. *Garyophyllorum*,
Costi odorati,
Zinziberis,
Cinnamomi an. drach. II.
Hermodactylorum,
Diagridii an. Unc. β.

Misce, fiat omnium pulvis, & cum triplo mellis ex vino albo decspumati & cocti f. f. a. Electuarium.

Cholagogum.

- ℞. *Pulp. prunor. acido dulc. Unc. X.*
Cremor. Tartari,
Scamm. optimi an. Unc. II.
Rhabarb. Electi drach. X.
Cinnamomi acuti Unc. β.
Santali citrini drach. II.
Sacchari clarificati Unc. XVI.
 Misce f. f. a. Electuarium.

Dia-Catholicon.

- ℞. *Rad. Polypodii quercini recent. Unc. IV.*
Sem. Fœniculi Unc. I.
Aquæ fontis lib. IV.
 Bulliant ad dimidias: colato adde
Sacchari albi Farinacei lib. II.
 Coquantur in Syrupum, quo dissolve
Pulparum Cassiæ,
Thamarindorum an. Unc. II.
 Dissolutis adde sequentia pulverisata,
Fol. Sennæ mundatorum Unc. II.
Rhabbarbari electi,

§4 P H A R M A C O P O E A

Mechoacannæ an. Unc. I.

Florum Violarum siccarum,

Seminum Anisi an. Unc. β.

Glycyrrhizæ,

*Seminum quatuor frigidorum majorum
enucleatorum an. drach. II.*

Misce f. f. a. Electuarium.

Dia-Phœnicum.

℞. *Pulpæ Palmularum in hydromelite mace-
rat. coctæ, & per setaceum transmissæ.*

Penidiorum recentium an. lib. β.

Amigdalæ dulcium expurg. Unc. III. β.

Contufis & permixtis omnibus, adde

Mellis despumati lib. II.

Coquantur paulum, deinde insperge
sequentes pulveres.

℞. *Zinziberis,*

Piperis longi,

Maceris,

Cinnamomi,

Fol. Ruthæ siccorum,

Sem. Dauci,

Fœniculi an. drach. II.

Turpethi Unc. IV.

Diagridii Unc. I. β.

Misce, f. f. a. Electuarium.

Hydragogum.

℞. *Baccar. Juniper. in aqua coct. Express. &
ad pulpæ consistent. redact.*

Pulpæ tamarindorum an. Unc. IV.

Rad. Jalappæ Unc. β.

Scam-

Scammonii Electi Unc. I.

Cinnam. acuti,

Sem. Fœniculi dulcis an. drach. II.

Sacchari clarificati Unc. X.

Misce f. f. a. Electuarium.

Electuarium de Succo Rosarum.

℞. *Succi Rosarum pallidarum depurati.*

Sacchari albi conglobati an. lib. I. β.

Coctis f. a. insperge sequentes pulveres:

Scammonii præparati Unc. I. β.

Santalorum omnium.

Cinnamomi an. drach. II.

Camphoræ scrup. I.

Misce f. f. a. Electuarium.

Hyera Pycra.

℞. *Cinnamomi,*

Maceris,

Azari,

Spicæ Indicæ,

Croci,

Mastices pulverisatorum an. drach. VI.

Aloës non lotæ pulverisatæ Unc. XII. β.

Mellis optimi depurati lib. IV. Unc. III.

Species melli despumato non sunt injiciendæ, nisi id ipsum ab igne fuerit remotum, ac ferè refrigeratum; alioquin Aloë rursus conglobatur, & picis instar indurata coit. Species etiam seorsim servantur in officinis.

Confectio Hamech.

Rx. Fol. Sennæ mundat.

Rad. Polypodii quercini,
Rhabarb. Electi,

Agarici albi &

Pulpæ colocynthidis in nodulo ligator.

Florum Violarum,

Herb. Epithymi an. Unc. II.

Absinthii vulgaris,

Thymi an. Unc. I.

Sem. Anisi,

Fœniculi,

Rosar. rubrar. an. Unc. ß

Infunde & coque in f. q. feri lactis colaturæ expressæ adde

Succi fumaricæ depurati,

Sacchari an. lib. I. ß.

Decoctis ad mellis consistentiam & percolatis adde

Pulpæ Cassiæ,

Prunorum,

Tamarindorum.

Mannæ calabrinæ an. Unc. I. ß.

In debitam consistentiam reductis insperge

Folior. Sennæ mundat.

Rhabarb. Electi an. Unc. I.

Scammonii præparati Unc. I. ß.

Semin. Fumaricæ,

Anisi,

Spicæ Nardi Indicæ an. drach. II.

F. f. a. Electuarium.

Passu-

Passulæ Corinthiacæ laxativæ.

℞. *Passularum Corinthiacarum mundatarum* Unc. IV.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad inollitiem, & in Unc. VIII. prædicti decocti, & vini albi Unc. II. infunde per 24. horas

Fol. Sennæ mundatorum drach. VI.

Cremoris Tartari pulverisati drach. II.

Seminis Anisi drach. I.

Posteà colentur, & colaturæ adde passulas jam coctas cum *Mannæ* & *Sacchari* albi ana Unc. II. & post unam alteramve ebullitionem repone.

Eodem modo parantur *Pruna Damascena* officinis ulitata.





CLASSIS SEXTA.

*Species Aromaticas & Pulveres
continens.*

Species Aromatici Rosati.

℞. *Rosar. rubrar. exungulatarum* dr. XV.

Glycyrrhizæ rasæ drach. VII.

Ligni Aloës,

Santali Citrini an. drach. III.

Cinnamomi electi drach. V.

Macis,

Caryophyllorum an. drach. II. β.

Gummi Arabici,

Tragacanthi an. scrup. VIII.

Nucis Moschatæ,

Cardamomi minoris,

Galangæ an. drach. I.

Spicæ Nardi scrup. II.

Misce f. f. a Pulvis.

Nota, quod omnes Pulveres servandi
sint in vase vitreo, vel fictili vitreato ad
usum.

Species Dia-margariti frigidi.

℞. *Margaritarum preparatarum* drach. III.

Radicum Contrayervæ,

Cinnamomi optimi,

Trium-santalorum,

Ligni Aloës,

Zedæa-

Zedoaria,
Baccarum Myrti,
Rasura Eboris,
Typhorum cornu Cervorum spagyricè
præparatorum,
Sem. Portulacæ,
Endiviæ,
Oxalidis,
Citri an. drach. I.
Coralli utriusque præparati an. drach. ß.
Flor. Buglossæ,
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Nymphææ an. drach. I.
Misce f. f. a. Pulvis.

Species Diambæ.

℞. Cinnamomi optimi,
Rad. Zedoariæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Folij Indici an. drach. III.
Spicæ Indicæ,
Cardamomi majoris,
minoris an. drach. I.
Zinziberis drach. I. ß.
Ligni Aloës,
Santali Citrini,
Piperis longi an. drach. II.
Ambre griseæ drach. I. ß.
Misce f. f. a. Pulvis.

Species Dianthos.

- ℞. *Florum Rorismarini Unc. I.*
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Violarum,
Glycyrrhizæ rasæ an. drach. VI.
Garyophyllorum,
Spicæ,
Nucis Moschatae,
Galangæ,
Cinnamomi optimi,
Zinziberis,
Zedoariae,
Macis,
Ligni Aloës,
Cardamomi minoris,
Semenum Anisi,
Anethi an. scrup. IV.
 Misce, & f. f. a. Pulvis.

Species Diarrhodonis.

- ℞. *Rosarum rubrar. exungulatarum dr. XI.*
Santali albi,
rubri an. drach. II.
Ligni Aloës,
Tragacanthi,
Eboris usti an. scrup. II.
Macis,
Spicæ Nardi,
Rhabarbari optimi,
Cinnamomi,
Garyophyllorum,
Croci,
Radicum Asari,

Fructuum Berberorum exsiccatorem,

Sem. Anisi,

Cardamomi,

Fœniculi,

Ocymi,

Papaveris albi,

Quatuor frigidorum minor. mundat.

Scariolæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Mastiches an. scrup. I.

Rasuræ cornu Cervi,

Margaritarum præparatarum an. scrup. I.

Camphoræ grana VII.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Species Dia-tragacanthi frigidi.

℞. *Gummi Tragacanthi albi Unc. ʒ.*

Arabici drach. II. ʒ.

Amyli drach. I.

Glycyrrhizæ,

Nucleorum sem. Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonum an. drach. ʒ.

Sem. Papaveris albi scrup. II. & grana V.

Sacchari candi drach. VI.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Species Lætificantis.

℞. *Melissæ,*

Corticum Citri extimorum exsiccatorem,

Garyophyllorum,

Mastiches,

Croci,

Cinna-

Cinnamomi,
Nucis Moschatae,
Cardamomi majoris,
Nucleorum seminum Paeoniae,
Been albi,
 rubri,
Zedoariae,
Doronici veri,
Sem. Ocymi Garyophyllati an. Unc. β.
Ligni Aloës,
Ossis de corde Cervi,
Margaritarum præparatarum an. drach. β.
Rasuræ Eboris drach. I.
Misce, f. f. a. Pulvis.

Species Dia-Curcumæ.

β. Croci,
Asari,
Sem. Petroselini Macedonici,
 Dauci,
 Anisi,
 Apii an. Unc. β.
Rhabarbari,
Rad. Angelicæ,
 Valerianæ majoris,
Spiciæ Indicæ an. drach. VI.
Scolopendrii seu Ceterach drach. II. β.
Costi,
Myrrhæ,
Cassia Lignæ,
Schœnanthi,
Cubebarum,
Rubiæ,
Succi Absinthij,

Eupa-

*Eupator.**Olei Garyophyllorum an. drach. II.**Calami Aromatici,**Cinnamomi an. drach. I. β.**Scordij veri,**Succi Glycyrrhizæ an. drach. II. β.**Tragacanthi drach. I.*

Misce f. f. a. Pulvis.

Species Dia-Galangæ.

℞. *Rad. Galangæ drach. VI.**Ligni Aloës,**Sem. Cumini,**Levistici,**Rad. Acori,**Zinziberis,**Piperis albi,**longi,**Garyophyllorum,**Cinnamomi,**Macis an. drach. I. β.**Folior. Calaminthæ,**Menthe siccat.**Spicæ Nardi Indicæ,**Sem. Apii,**Anisi,**Cardam. min.**Carni,**Feniculi an. drach. I.*

Misce f. f. a. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus Magistralis.

℞. *Bezoar. mineral. Unc. II.**Terræ Sigillatæ,*

Coral-

Corallorum præpar. an. Unc. I.
Cinnabar. nativi,
Coccinellæ an. Unc. ß.
Camphoræ drach. II.
 Misce f. Pulvis.

Pulvis è Chelis Cancrorum.

℞. *Margarit. Orient. præparat.*
Oculor. Cancr.
Corallor. rubr.
Succini albi,
Bezoard. Occident.
Pulv. Viperar.
Cornu Cervi spagyr. præpar. an. dr. VI.
Contra-yervæ,
Serpentariæ Virgin. an. Unc. ß.
Chelorum Cancrorum ad pondus omnium.
 Misce f. Pulvis.

Pulvis Cachecticus.

℞. *Limaturæ Chalybis subtiliss. pulver. Unc. I.*
Rad. Aronis drach. I. ß.
Ocul. Cancr.
Cornu cervi spagyr. præpar.
Succini,
Cinnamomi acuti an. scrup. II.
 Misce f. Pulvis.

Pulvis ad Casum.

℞. *Sanguinis Draconis optimi drach. II.*
Sanguinis Hirci optimè præparati,
Oculorum Cancrorum præparatorum,
Boli Armeni optimi an. drach. III.
Myrrhæ rubræ,
Radicum Rubiæ tinctorum an. drach. II.
 Nucis

Nucis Moschatae drach. I. ꝑ.

Rhabarbari optimi,

Spermatis Ceti recentioris an. drach. I.

Misce, & fiat Pulvis subtilissimus.

Pulvis Liberans.

ꝑ. *Boli Armeni debite præparati Unc. I. ꝑ.*

Terræ Lemniæ Orientalis Unc. I.

Corallorum albor. præparatorum drac. III.

rubrorum præparat. drach. II.

*Lapidum pretiosorum, Smaragdi, Rubi-
ni, Hyacinthi an. drach. II.*

Margaritarum præparatarum drac. II. ꝑ.

Cinnamomi drach. I.

Garyophyllorum drach. ꝑ.

Seminis Acetosæ drach. I.

Corticum Citri,

Santali rubri,

albi an. drach. ꝑ. grana XV.

Spodii drach. II. ꝑ.

Rasuræ Eboris drach. I. ꝑ.

Croci Orientalis drach. ꝑ.

Misce, & f. omnium Pulvis, cui admisce

Folia Auri bracteati Num. XX.

Pulvis contra Abortum.

ꝑ. *Rasuræ Eboris,*

Granorum Chermetis an. drach. I.

Santali rubri drach. ꝑ.

Garyophyllorum scrup. I.

Nucis Moschatae scrup. II.

Radicum Tormentillæ drach. ꝑ.

Margaritarum præparatarum,

Coralli utriusque præparator. an. scrup. I.

E

Folia

Folia auri Num. III.

Sacchari tabulati perlati drach. III.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis de Gutteta.

℞. *Rad. Pæoniæ maris Lunâ decreſcente collectarum.*

Seminum ejusdem.

Dictamni albi,

Visci quercini veri an. Unc. β.

Seminum Atriplicis drach. II.

Cranii humani crudi pulverisati drac. III.

Cerallorum rubrorum præparatorum,

Hyacinthorum præparatorum an. drac. I. β.

Ungule Alcis præparatæ Unc. β.

Foliorum Auri drach. I.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis Haly.

℞. *Sem. Papaveris albi drac. I. & grana XV.*

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Spodii ex Ebore,

Amyli,

Glycyrrhizæ an. scrup. I. & grana II.

Sem. Portulacæ;

Malvæ,

Althææ mundat. an. dr. β. & gr. VII

Sem. quatuor frigidorum maj. excorticat.

Cydoniorum excorticatorum an. scr.

II. & grana XII.

Sacchari candi albi ad pondus omnium.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Nota, quod hic Pulvis ſemper recens parari debeat.

Pulvis Hæmophthoicus.

℞. *Capitis mortui Vitrioli post spiritus & olei extractionem relictæ & subtilissimè pulverisati lib. I.*

Infunde per horas 24. in aquæ ferventis lib. VI. postea decanta aquam per inclinationem, & novam aquam semper singulis 24. horis affunde, & vigesies hunc laborem repete, donec Pulvis omni acrimonia & austeritate privatus sit, insipidusque evadat.

Aquas infusionum ne abjicias, sed ad usum Medicum serva in vase vitreo.

Pulvis Pleuriticus.

℞. *Rasuræ minutissimæ dentium crudorum Apri Unc. β.*

Flor. Papaveris Rhæados drach. I. β.

Priapi Cervi drach. III.

Oculorum Cancrorum præp. an. drac. II.

Radicum Bardanæ,

Sanguinis Hirci præparati an. Unc. β.

Croci drach. I.

Misce, & fiat Pulvis tenuissimus.

Pulvis Reginæ.

℞. *Rad. Curcumæ Unc. I.*

Sem. Saxifragiæ,

Milij Solis an. drach. III.

Sem. Anisi,

Apri,

E 2

Carui,

*Carui,**Cumini.**Fœniculi,**Petroselini,**Rutæ an. drach. II.**Glycyrrhizæ rasæ drach. III.**Granorum Juniperi,**Baccarum Lauri,**Nucis Moschatæ,**Galangæ,**Sanguinis Hircini præparati,**Cinnamomi acuti an. drach. II.**Croci scrup. I.*

Misce, & fiat omnium Pulvis, cui pro
arbitrio Medici additur saccharum.

Pulvis Stomachicus.

℞. *Rad. Ari præparatarum Unc. II.*

*Pimpinellæ Saxifragæ,**Acori vulgaris an. Unc. I.**Oculorum Cancrorum præparatorum,**Cinnamomi acuti an. drach. III.**Salis Absinthii,**Juniperi an. drach. I.*

Misce f. Pulvis.

Pulvis contra Vermes.

℞. *Cornu Cervi nsti Unc. II.*

*Seminum Zedoariæ Unc. I.**Caulium,**Portulacæ,**Corallinæ an. Unc. ℥.*

Misce, & fiat Pulvis.



CLASSIS SEPTIMA.

Continens Pulveres solutivos.

Pulvis Catholicus.

- ℞. **D**iagridii drach. IX.
*Antimonii per trinam detonationem
 cum tertiâ parte nitri parati & non
 edulcorati drach. VI.*
Tartari crystallini drach. III.
 Misce f. Pulvis.

Pulvis Dia-Carthami.

- ℞. *Medulle seminis Carthami,*
Hermodaetylorum mundatorum,
Specierum Dia-tragantbi frigidi an. Unc. ʒ,
Turbith optimi drach. VI.
Diagridii drach. III.
Zinziberis,
Cinnamomi an. drach. II.
 Misce, & f. f. a. Pulvis.
*Nota, quod Diagridium semper sit per
 se terendum, postea aliis immiscendum.*

Pulvis Dia-turbith cum Rheo.

- ℞. *Rhabarbari optimi drach. X.*
Turbith albi & gummosi,
Hermodaetylorum mundator. an. Unc. I.
Diagridii Unc. ʒ.
Zinziberis,

Santali albi,
rubri,
Florum Violarum an. drach. I. β.
Mastiche,
Semin. Anisi,
Cinnamom.
Croci an. drach. β.
 Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis Hermodactylatæ Venetæ.

℞. *Hermodactylorum à cortice superiori mundatorum Unc. I. β.*
Turbith alb. & gummosi Unc. I.
Glycyrrhizæ rasæ,
Mechoacæ albæ an. drach. VI.
Diagridii drach. III.
Zinziberis drach. II.
 Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis Sennæ Montagnanæ.

℞. *Fol. Sennæ Orientalium mundator. Unc. II.*
Cremoris Tartari Unc. β.
Semin. Fœniculi dulcis drach. II.
Salis gemmæ,
Macis,
Cinnamomi an. drach. I.
 Misce, & fiat Pulvis.

Pulvis pro Suppositoriis.

℞. *Aloës drach. II.*
Cumini,
Rutæ,
Salis gemmæ an. drach. I.
 Misce & f. Pulvis qui cum f. q. mellis cocti subigatur & f. Supposit.
 Si fortiora desiderentur potest addi
Trochif. albandal drach. I.

CLASSIS OCTAVA.

De Antidotis & Opiatis.

Confectio Alkermes.

R. *S* Trupi granorum Kermes Montepessulo
delati lib. II. ꝑ.

Calefacto adde

Ambræ griseæ minutim incisæ drach. II.

Liquefactâ Ambrâ insperge sequentes
pulveres

Ligni Aloës,

Cinnamomi an. drach. VI.

Lapid. Lazuli præpar.

Margarit. Orient. an. drach. II.

Fol. Auri N. XX.

Misce f. Electuarium.

Diascordium Fracastorii.

R. *Fol. Scordii siccator.*

Rosar. rubrar. an. Unc. I.

Boli Armeni veri Unc. II.

Rad. Bistortæ,

Gentianæ,

Tormentillæ,

Cassie lignæ,

Cinnamomi,

Dictamni cretici,

Sem. Acetosæ,

Styracis calamitæ,

Galbani,
 Gummi Arabici an. Unc. ꝑ.
 Opii Thebaici præpar.
 Zinziberis,
 Piperis longi an. drach. II.
 Mellis despumati lib. III.
 Vini generosi Canarini q. s.
 F. s. a. Opiatum.

Confectio Hyacinthorum.

℞. Hyacinthorum,
 Coralli rubri
 Boli Armeni
 Terræ Lemniæ an. Unc. ꝑ.
 Granorum Kermes,
 Rad. Tormentillæ,
 Dictamni,
 Sem. Acetosæ,
 Limonum,
 Portulacæ,
 Flor. Rosarum rubr.
 Crocī,
 Santalor. omnium,
 Rasuræ Eboris an. scrup. IV,
 Cornu cervi drach. III.
 Sapphiri,
 Smaragdi,
 Topasii,
 Margaritarum,
 Fol. Auri,
 Argenti an. scrup. II.
 Syrupi de Cortice citri q. s.
 Misce f. s. a. Electuarium.

Mithri-

Mithridatium Damocratis.

- ℞. *Radicum Zinziberis*,
Spicæ Nardi mundatæ,
Cinnamomi,
Croci Britannici,
Agarici albi & *levis*,
Myrrhæ electæ,
Thuris masculi,
Sem. Thlaspios an. drach. X.
Seseleos Massiliensis,
Costi odorati,
Fol. Malobatri, ejus loco, *Corticum*
exteriorum Citri,
Schœnanthi,
Stœchados Arabicæ,
Piperis longi,
Succi Hypocistidos,
Galbani in guttis,
Opoponacis in guttis,
Syracis Calamitæ in guttis,
Therebintinæ Cypriæ,
Opobalsami, ejus loco, *Olei Nucis Mo-*
schatæ per expressionem facti,
Castorei an. Unc. I.
Cassie lignæ,
Foliorum Polij montani albi,
Scordii veri,
Piperis albi,
Carpobalsami, ejus loco, *Gran. Juniperi*,
Seminis Dauci Cretici,
Bdellij,
Trochiscorum Cypheos an. drach. VII.
Nardi Celticæ purgatæ,
Radicum

Radicum Gentianæ,
Dictamni Cretici,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Gummi Arabici vermiculati,
Opii Thebaici nitidi præparati,
Sem. Cardamomi minoris,
Fœniculi,
Petroselinæ Macedon. an. drach. V.

Rad. Acori,
Asari,
Valerianæ majoris,

Sem. Anisi,
Sagapeni an. drach. III.

Rad. Men Athamantici,

Sem. Hyperici,

Acaciæ,

Lumborum Scinci an. drach. II. ꝑ.

Mellis deſpumati optimi & debite cocti
lib. IX. Unc. VIII. & drach. II.

Diffolvantur fucci, & Gummi (præter
 Arabicum & Thus, quæ teri debent) vino
 Malvatico, & f. f. a. Electuarium.

Philonium Romanum.

ʒ. *Piperis albi,*
Cassiæ lignæ,
Cinnamomi an. drach. II.
Euphorbij,
Pyretri an. drach. ꝑ.
Zedoariæ,
Succi Nardi an. scrup. II.
Sem. Hyosciami albi Unc. ꝑ.
Opij præparati drach. II. ꝑ.
Croci drach. ꝑ.

Casto-

Castorei,

Myrrhæ an. drach. I. ß.

Sem. Apij,

Fœniculi,

Dauci,

Petroselinæ an. drach. I.

Mellis optimi despumati lib. I.

Dissolvatur *Opium* cum modico vini,
cui admisceantur *Crocus*, & *Euphorbium*
subtilissimè pulverisata, & addito melle
inspergantur Pulveres, & misceantur,
fiatque f a. Electuarium Opiatum.

Requies Nicolai.

℞. *Flor. Rosarum rubrarum exungulatarum.*

Violarum an. drach. III.

Opij præparati,

Sem. Papaveris albi,

Hvosciami albi,

Scariolæ,

Lactucæ,

Portulacæ,

Psyllii,

Corticum Radicum Mandragoræ,

Nucis Moschatæ,

Cinnamomi an. drach. I. ß.

Santali albi,

citrini,

rubri,

Spodij,

Tragaganthæ an. scrup. II. & grana V.

Mellis despumati optimi & cocti triplum.

Misce, & fiat Electuarium Opiatum.

The-

Theriaca Andromachi senioris.

℞. Trochiscorum Scylliticorum Unc. VI.

De Viperis,

Magmatis Hedycroi,

Piperis longi,

Opii Thebaici præparati an. Unc. III.

Radici Ireos Florentinae,

Agarici albi & levis,

Comarum Scordij veri,

Rosarum rubrarum exungulatarum,

Cinnamomi,

Opobalsami, ejus loco, Olei Nucis Mu-
chatae,

Succi Glycyrrhizæ,

Sem. Napi agrestis an. Unc. I. β.

Rad. Costi odorati,

Quinquesolij,

Rhapontici, vel si desit, Rhabarbari,

Spicæ Nardi Indicæ,

Zinziberis,

Cassie lignæ,

Fol. Dictamni Cretici,

Calaminthæ montanæ,

Prassii albi,

Schoenanthi,

Stœchados Arabicæ,

Croci Britannici,

Piperis albi,

nigri,

Sem. Petroselini Macedonici,

Theribenthinae Cypriæ,

Thuris masculi,

Myrrhæ an. drach. VI.

Rad,

Rad. Gentianæ,
 Men Athamantici,
 Valerianæ majoris,
 Nardi Celticæ,
Foliorum Malobatri, ejus loco, Corti-
 cum Limonis siccatorum,
Polij montani albi,
Comarum Chamædrijos,
 Chamæpyteos,
 Hyperici,
Carpobalsami. ejus loco, Bascar. Juniperi
Anomi, ejus loco, Acori veri,
Sem. Anisi,
 Ammios,
 Cardamomi minoris,
 Fœniculi,
 Seseleos Massiliensis,
 Thlaspios,
Terræ sigillatæ Orientalis,
Chalcitidis præp. ad color. cineritium usque
Succi Acaciæ condensati,
Hypocistidis,
Syracis calamitæ in guttis,
Gummi Arabici vermiculati,
Sagapeni an. Unc. β.
Radicum Aristolochiæ tenuis,
Summitatum Centaurij minoris,
Sem. Dauci Cretici, illius loco, Nostrati,
Galbani in guttis,
Opoponacis in guttis,
Bituminis Judaici,
Castorei an. drach II.
Mellis optimi despumati & ad consisten-
 tiam cocti lib. XIV. Unc. V. & dr. II.
 Dissol-


Dissolvantur Succi & Gummi vino
Malvatico, fiatque f. a. Electuarium.

Theriaca Dia-testaron.

℞. *Rad. Gentianæ,*
Aristolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri excorticatarum,
Myrrhæ an. Unc. I.
Mellis despumati lib. I.
 Misce, & f. f. a. Electuarium.

Electuarium è succo Ruthæ

℞. *Rad. Aristolochiæ longæ veræ,*
Rotundæ,
Rubiæ tinctorum,
Baccarum Lauri excorticatarum,
Granorum Juniperi,
Sem. Dauci,
Agni casti,
Rutæ,
Sabinæ an. drach. l.
Croci,
Lapidis Gagatis,
Myrrhæ,
Castorei an. scrup. l.
Nucleorum seminum Pæoniæ scrup. II.
Dictamni Cretici drach. β.
 Fiat omnium pulvis, & cum
Sacchari albi succo Rutæ dissolvti Unc. III.
 Fiat lege artis Electuarium.



CLASSIS NONA.

De Pilulis, Extractis, & Essentiis.

Pilulæ Aloëphanginæ.

R. *C* *Innamomi,*
Garyophyllorum,
Cardamomi minoris,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Calami aromatici,
Carpobalsami, ejus loco, *Baccar. Juniperi*
Schænanthi,
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Absinthij siccati an. Unc. ß

Ex his crassiusculè tritis educatur per spiritum vini tinctura in vase vitreo probè clauso: in *Colaturæ lib. III.* nutriatur.

Aloës purissimæ lib. I.

Cui dissolutæ adde

Mastiches,

Myrrhæ pulverisatarum xn. Unc. ß.

Croci drach. II.

Balsami Feruviani drack. I.

Tandem absumptâ humiditate superfluâ, super cineres calidos, aut in Hypocausto redigantur in *Massam Pilularum.*

Pilulæ

Pilulæ Cochiae.

- ℞. *Specterum Hyeræ simplicis Galeni* drac. X.
Trochiscorum Albandal dr. III. & *scrup.* I.
Diagridij drach. II. β.
Turpethi,
Stæchados an. drach. V.
 Misce cum Syrupo de *Stæchade*, fiat Massa.

Pilulæ Foetidæ.

- ℞. *Gummi Sagapeni in guttis*,
Ammoniaci in guttis,
Opoponacis in guttis,
Bdellij in guttis,
Trochiscorum Albandal,
Sem. Rutæ agrestis, vel
Hortensis siccae,
Aloës,
Epithymi an. drach. V.
Hermodactylorum,
Esulæ præparatæ an. drach. II.
Diagridij drach. III.
Cinnamomi,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Castorei an. drach. I.
Turbith Unc. β.
Zinziberis drach. I. β.
Euphorbij scrup. II.
Succi Porri depurati quantum sufficit,
 fiat Massa.
 Observandum *Succum Porri* coquen-
 dum esse cum paucis Melle.

Pilulæ de Nitro.

- ℞. Aloës,
 Trochiscorum Albandal,
 Diagridij,
 Hellebori nigri flore purpureo,
 Bdellij,
 Gummi Arabici an. drach. II.
 Euphorbij præparati,
 Nitri an. drach. I.
 Misce cum Melle Rosato, & fiat Massa

Pilulæ Ruffi.

- ℞. Aloës electæ Unc. II.
 Myrrhæ Unc. I.
 Croci Unc. β.
 Cum Syrupo Limonum fiat Massa.

Pilulæ Spleneticæ.

- ℞. Rad. quinque aperient. mundat. an. Unc. I.
 Corticum Radicum Capparum,
 Tamarisci an. Unc. β.
 Herb. Fumarie,
 Cardui benedicti,
 Chamædryos,
 Scolopendriæ,
 Eupatorii Cannabini an. m. I.
 Ceterach,
 Lingue Cervinæ an. m. β.

Bulliant s. a. in sufficienti quantitate aquæ
 Endiviæ ad lib. III. In colatura efferves-
 cant, & macerentur.

- Fol. Senæ mundatorum Unc. IV.
 Sem. Anisi,

Fœniculi an. Unc. β.

In colatura dissolve

Aloës lotæ Unc. VI.

Resinæ Scammonij Unc. III.

Evapora ad consistentiam Pilularum.

Pilulæ de Cynoglossâ.

℞. *Myrrhæ optimæ drach. VI.*

Thuris masculi drach. V.

Rad. Cynoglossæ siccatarum,

Sem. Hyosciami,

Opij præparati an. Unc. β.

Croci,

Castorei an. drach. I. β.

Misce, & cum Syrupo de Stæchade fiat Massa. Opium tritum cum Syrupo primum subigitur, tum reliqua simplicia.

D E E X T R A C T I S.

Extractum Catholicon.

℞. *Pulpæ Colocynthidis drach. VI.*

Agarici albi,

Hellebori nigri,

Pulv. Diarrhod. an. Unc. β.

Impone Matraccio cum f. q. Spirit. Vini extrahatur Tinctura in B. M. tum percolatæ adde pulverum

Aloës lucidæ Unc. I.

Scammonij præparati Unc. β.

Evaporent in consistentiam Extracti.

Eodem modo fiunt extracta aliarum pillularum.

Lau-

Laudanum Opiatum.

℞. *Opij Thebaici spiritu vini dissoluti paululum cocti & colati Unc. I.*

Misceatur cum tincturâ mediante spiritu vini extractâ ex

Pulveris Diambrae Unc. ℞.

Evaporent in consistentiam pillularum sub finem addendo

Croci Britannici drach. I.

Castorei drach. ℞.

Servetur massa usui.

Resina Scammonii.

℞. *Scammonii pulverisati q. v.*

Superfunde spir. vini rectific. ad super eminentiam quatuor digitorum transvers. digerantur per dies aliquot in loco calido. Colatura fortiter expressa per chartam bibulam evaporetur. Dein affusione aquæ frigidæ præcipitabitur ad fundum resina quæ abluenda & exsiccanda est.

Eodem paratur modo

Resina Agarici,

Guajaci,

Jalappæ &

Magisterium guttæ gambæ &c.

Extractorum conficiendorum methodus generalis.

Parari possunt *Extracta*, ex omni fere materia Medica, seu è quovis medicamento (sive simplici, cujusmodi sunt herbae, flores, semina, &c. sive composito, qualia sunt species, massæ Pillularum, &c.)

quod tincturam menstruo, cui infunditur, communicare solet. Itaque sumatur cujvis materiæ Medicæ, concisæ, contusæ vel aliter, ut pro infusione res postulat, præparatæ quantum vis, affundatur *Spiritus vini*, vel *aquæ Stillatiæ* Medici præscribentis intentioni accommodæ quantum sufficit, mancant in infusione ad calorem Balnei, vel alium lentum, per biduum, plus minùs, prout densitas vel tenuitas materiæ postulaverit, donec liquor medicamento tincturâ imprægnetur. Tum liquor tinctus separetur per inclinationem, affuso novo Menstruo, post infusionem, ut priùs, separando: idque toties repetendum, quoties medicamentum de se tincturam liquori impertierit. Liquores tincti conjungantur, per chartam emporeticam agantur: & tandem calore Balnei exhalet humiditas, donec materia in fundo vasis ad mellis consistentiam redigatur, quæ ad usum servanda: cui etiam ad Medici præscriptum nonnihil salis proprii, vel alterius idonei (v. g. scrupuli duo vel semidrachma ad singulas *Extracti* uncias) ut diutiùs humidum maneat, adjungi potest.

Essentia Absynthii.

R. Absynth. q. v.

Affunde spirit. vini q. f. ut extrahatur tinctura

Hujus tincturæ lib. I.

Extract. absynth. Unc. ß.

Salis absynth. drach. II.

Commixta circulando digerantur donec probe uniântur.



CLASSIS DECIMA.

De Trochiscis.

Agaricus Trochiscatus.

℞. *Agarici albi* & *levis* *Unc. I.*

Cum f. q. vini Canarini cui Zinziberis drach. I. sit infusa cogatur f. a. in Trochiscos.

Trochisci albi Rafis, seu Sief album.

℞. *Cerussæ aquâ Rosarum lotæ* drach. X.

Sarcocollæ crassioris drach. III.

Amyli drach. II.

Gummi Arabici nitidi,

Tragacanthi an. drach. I.

Campboræ drach. β.

Pulverisentur f. a. & cum albumine ovi aquâ Rosarum conquassati fiant Trochisci. Interdum pro arbitrio Medici additur Opium.

Trochisci Alhandal.

℞. *Pulpæ Colocynthidis albæ* & *levis à seminibus purgatæ* *Unc. X.*

Incidatur *Pulpa* hæc minutissimè, & cum quantitate sufficienti *Olei Amygdalarum dulcium recentis* fricetur & pulverisetur: deindè sume

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

F 3

Bdel.

Bdellij an. drach. III.

Quæ ruditer contusa macerentur in q. 1. aquæ *Rosarum* donec dissolvantur, & cum parte lachrymarum solutarum formentur *Trochisci*, qui in umbra siccentur: siccati iterum minutissimè conterantur, & cum reliqua *mucilagine* rursus formentur *Trochisci*.

Trochisci hi nihil aliud sunt, quàm *Colocynthis præparata* qui imponi possunt omnibus compositionibus *Colocynthidem* recipientibus: sicut etiam mos hucusque obtinuit, ut in singulis compositis Pharmacis *Colocynthidem* desiderantibus pro cruda *Colocynthide Trochiscos* hos substituamus, quorum quoque usus in catapotiis acuandis creber esse solebat.

Trochisci Alkekengi.

℞. Fructuum Halicacabi drach. I. β.

Sem. Citrulli,

Cucurbitæ,

Melonum an. drach. I. β. ℥ gr. XV.

Boli Armeni,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Sanguinis, id est, Lachrymæ Draconis,

Amygdalarum amararum mundatarum,

Pinearum mundatarum,

Succi Glycyrrhizæ,

Amyli,

Sem. Papaveris albi,

Apj,

Hyosciami,

Ca-

Carabes, seu Succini albi,
Terræ sigillatæ,
Opij præparati an. drach. I.

* Cum succo *Halicacabi*, vel aqua *Rosacea*
 in qua ejusdem fructus sicci fuerint mace-
 rati, fiant s. a. *Trochisci*.

Trochisci Bechici nigri.

℞. *Succi Glycyrrhizæ inspissati Unc. II.*
Styracis Calamitæ drach. VI.
Sacchari candi albi drach. X.
Specier. Diatragac. frig. drach. I. β.
Pulv. Ireos drach. β.
Loboch sani drach. II.
Sacchari Penidij Unc. III.
Sacchari albißimi lib. I. & Unc. I. β.
Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Hy-
sopi factæ quantum sufficit.
 Fiant *Trochisci*.

Trochisci de Capparibus.

℞. *Corticum Radicum Capparum,*
Seminum Agni-casti an. drach. III.
Gummi Ammoniaci in guttis drach. II.
Sem. Nasturtij,
Nigellæ,
Fol. Calaminthæ montanæ,
Rutæ,
Rad. Acori,
Aristolochiæ rotundæ,
Succi Eupatorii inspissati,
Amygdalarum amarar. excorticatarum
an. drach. I.
Fol. Scolopendrij, id est, Ceterach,
 F 4 *Rad.*

Rad. Cyperi rotundi,

Rubiae tinctorum,

Gummi Laccae an. drach. β.

Ammoniacum in mortario calido aceto acerrimò dissolve ad mellis consistentiam, cui immisce succum *Eupatorij* inspissatum & pulveres, formando s. a. pastam, & ex ea *Trochiscos*.

Trochisci de Carabé.

℞. *Carabes* Unc. β.

Cornu Cervi usti,

Gummi Arabici tosti,

Tragacanthi,

Coralli rubri usti,

Succi Acaciae,

Hypocistidos,

Balaustiorum,

Mastiches,

Lacca,

Sem. Papaveris nigri assi an. scrup. IV.

Thuris,

Croci,

Opii præparati an. drach. I.

Mucilaginis sem. Psyllij aqua Plantaginis extractæ q. s.

Formentur Trochisci.

Trochisci Cypheos.

℞. *Pulpæ Uvarum passarum pinguium à cortice & acinis* probè mundatarum.

Terebinthinæ Cypriæ coctæ an. Unc. III.

Myrrhæ,

Schoenanthi an. Unc. I. β.

Calami aromatici drach. IX.

Cinnamomi Unc. ꝑ.

Bdellij optimi,

Spicæ Nardi,

Cassiae lignæ,

Radicum Cyperi,

Baccarum Juniperi an. drach. III.

Asphalati, seu Ligni Aloës an. drach. II. ꝑ.

Croci drach. I.

Mellis Narbonensis despumati q. s.

Vini Canarini modicum.

Myrrha & Bdellium terantur in mortario calido cum *Vino Canarino* ad crassitudinem liquidi mellis, addatur mox *Terebinthina*, deindè *Pulpa ex carne Passularum* per sectaceum extracta; tum *pulveres*, omnia demùm excipiantur *melle despumato* ad debitam consistentiam cocto; coganturque in *massam* ex qua fiant *Trochisci*.

Trochisci Gordonii.

℞. Sem. quatuor frigidorum majorum enu-
cleatorum,

Papaveris albi,

Malvæ,

Bombacis excorticati,

Portulacæ,

Cydoniorum,

Myrtillorum,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Nucleorum Pineorum mundatorum,

Pistachiorum,

Sacchari Candi,

Peni-

Penidij,
Glycyrrhizæ rasæ,
Mucilaginis seminum Psyllij,
Amygdalarum dulcium excorticatarum
an. drach. II.

Boli Armeni,
Sanguinis, id est, *Lachrimæ Draconis*,
Spodij ex ebore,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Myrrhæ an. Unc. β.

Cum quantitate sufficienti *Hydromelitis*
 fiant s. a. *Trochisci*.

Trochisci Hedychroi.

℞. *Ligni Asphalathi*, pro quo *Santali Citrini*,
Foliorum Majoranæ,
Mari, pro quo *Dictamni*,
Rad. Azari an. drach. II.
Pbu pontici, id est, *Rad. Valerianæ maj.*
Costi,
Calami aromatici, pro quo *Acori veri*,
Ligni Aloës,
Cinnamomi,
Schœnanthi,
Opobalsami, aut *Olei Nucis moschata* per
expressionem an. drach. III.
Cassie lignæ,
Folij Malabatri, pro quo *Corticis exte-*
rioris Citri siccati,
Spicæ Nardi Indicæ,
Myrrhæ,
Croci ana drach. VI.
Anommi, pro quo *Acori veri Unc. I. β.*
Masticis drach. I.

Vini

Vini Canar. quantum sufficit.

Myrrha dissolvatur cum *Vino*, mox *Crocus*, & *Mastiche* probè trita adjiciantur, deindè *Opobalsamum*, tunc reliqua in *pulverem* redacta admisceantur, *Vino* subindè affuso, & cogantur in *pastam* ex qua formentur *Trochisci* in umbra siccandi.

Trochisci de Myrrha.

℞. *Myrrhæ electæ drach. III.*

Lupinorum drach. V.

Fol. Rutæ,

Mentastri,

*Pulegij Cervini, id est, Dictamni
cretici,*

Rubiæ tinctorum,

Semin. Cumini,

Assæ fœtidæ,

Sagapeni,

Opoponacis an. drach. II.

Dissolvantur *Gummi* in mortario calido, *Aceto Scyllitico*, addendo *species*, & cum quantitate sufficiente *succi Arthemisiæ* cogantur in *pastam*, ex qua formentur *Trochisci*.

Trochisci Scyllitici.

℞. *Carnis Scyllæ assatæ lib. I.*

Farinæ Orobi albi & non rufi Unc. VIII.

Tere in mortario marmoreo, & fiat *pastam* ex qua formentur *Trochisci*, qui ponantur in superiore parte ædium meridiem spectante in umbra, sæpiùs obvertendo, donec probè siccati tuerint.

Tro-

Trochisci de terrâ Sigillatâ.

℞. *Terræ sigillatæ*,
Boli Armeni,
Sanguinis, id est, *Lachrymæ Draconis*,
Gummi Arabici tosti,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Amyli tosti,
Acaciæ,
Hypocistidis,
Lapidis Hematitidis,
Balaustiorum,
Coralli rubri,
Carabes ana drach. I.
Spodij ex Ebore,
Margaritarum præparatarum,
Tragacanthi,
Sem. Papaveris nigri an. drach. I. ß.
Sem. Rosarum rubr. sive Antheræ drac. I.
Portulacæ,
Cornu Cervi usti,
Thuris masculi,
Conorum Cupressi,
Croci an. drach. II.
 Cum succo vel aqua *Plantaginis* fiant
Trochisci.

Trochisci Viperini.

Aliunde petantur.



CLASSIS UNDECIMA.

De Oleis per expressionem.

Oleum Amygdalarum dulcium.

R. *Amygdalarum dulcium ficarum non tamen rancidarum q. v.*

Contunde in mortario marmoreo minutissimè, & dein ex his tritis & telâ cannabinâ involutis prælo sensim Oleum exprime.

Eodem modo fiunt.

Olea Amygdalarum amararum.

Sem. Lini,

Papaveris albi &c.

Oleum Ovorum.

R. *Ova recentia numero triginta aut plura.*

Coquito donec penitus induruerint, ex his *Vitellos* exime, & comminutos in fartagine igne mediocri assa, spatulâ assiduè movendo, donec rufescant, & pinguedinem quandam exudent: dein adhuc ferventes sacculo cannabino aut pilis contexto excipiantur, & prælo committantur, ut *Oleum* effluat usui reponendum.

*Olea Simplicia per Infusionem
& Decoctionem.*

Oleum Rosatum.

R. *Olei Olivarum non rancidi lib. X.*

*Rosarum rubr. recent. non penitus aperta-
rum, leviter contusarum lib. IV.*

Misceantur, insolentur, aut loco cali-
do detineantur per *viginti dies*; dem co-
quantur lento igne, non tamen ad omni-
modam humiditatis consumptionem, po-
stea fortiter exprimantur: expressum *Oleum*
servetur.

Eo quo *Rosatum* modo, fiant & sequen-
tia, eâ animadversione tamen adhibitâ,
ut in coquendis *Herbarum calidarum Oleis*,
earum *decoctum* addatur. Item quod *Oleum*
Rosatum, *Cherinum*, *Violarum*, sola etiam
insolatione fieri possint, vel saltē parū
bullire debeant, non autem referre, si ex
Herbis calidis Olea diutius bullierint.

Oleum de Absynth. vulgari & recenti Latifolij,
Chamomelinum, ex floribus recentibus.
Liliorum alb. ex floribus abjecto luteo,
Nymphaeae, ex flor. albis abjecto luteo,
Rutae, ex herba virente,
Violarum, ex Violis recentibus.

*Olea Composita per Infusionem
& Decoctionem.*

Oleum de Capparibus.

R. *Corticum Radicum Capparum Unc. II.*

Cor-

Corticis mediani Tamarisci,
Fol. Tamarisci,
Sem. Agni casti,
Ceterach,
Rad. Cyperi an. Unc. β.
Rutæ drach. II.
Aceti vini accerrimi,
Vini albi generosi an. Unc. IV.
Olei maturi lib. II.

Macerentur f. a. per biduum, deindè
 coquantur lento igne ad consumptionem
 vini & acetis, Oleum colatum reservetur
 ad usum.

Oleum de Castoreo.

℞. *Castorei,*
Styracis Calamitæ,
Galbani,
Euphorbii,
Cassie lignæ,
Croci,
Opoponacis,
Carpobalsami, aut Cubebarum,
Spicæ Nardi Indicæ,
Costi an. drach. II.
Cyperis,
Schœnanthi,
Piperis longi,
nigri,
Sabinæ,
Pyrethri an. drach. II. β.
Olei lib. III.
Vini Hispanici lib. II.
 Confice sic, Galbanum & Opopanacem
 in

in *vino* seorsim dissolve, deindè reliqua omnia contusa cum *oleo* & *vino* coquito in duplici vase ad consumptionem *vini*: Postea cola, ac dissolutum & expressum *Galbanum* cum *Opoponace* *oleo* affunde, & iterum coque sufficienter, ac repone, sæpius miscendo imposterum, ut *Galbanum* & *Opoponax* in vasis fundo subsidentia *oleo* commisceantur.

Oleum Catellorum.

℞. *Olei Olivarum* lib. IV.

Catellos nuper editos Num. II.

Vermium terrestrium vino albo submersorum & *lotorum* lib. I.

Coctis *Catellis* ad ossium compaginis dissolutionem, adjiciantur *Vermes* & rursum coquantur ad humiditatis excrementitiæ evaporationem, expressioni adde

Terebinthinæ Cypriæ Unc. III.

Spiritus vini Unc. I.

Et perficiatur s. a. *Oleum*.

Oleum Croci.

℞. *Croci* Unc. β.

Myrrhæ electæ drach. II.

Aceti vini Unc. IV.

Cardamomi drach. IV. & β.

Olei Unc. IX.

Crocum & *Myrrham* diebus quinque macera cum *aceto*, die sexto *Cardamomum*, septimo cum *oleo* coquantur igne lento ad *aceti* consumptionem.

Oleum

Oleum de Euphorbio.

℞. *Staphidis Agriæ*,
Saponariæ an. Unc. β.
Pyrethri drach. VI.
Calaminthæ montanæ siccæ Unc. I. β.
Costi drach. X.
Castorei drach. V.

Trita, triduoque macerata in *vini odoriferi lib. I.* coquantur ad medias. Deindè frica multum diuque manibus, & cola, & cum *Olei cheyrini lib. I. β.* coque ad *vini* reliqui consumptionem : in hoc oleo solve.

Gummi Euphorbij electi & tenuissimè triti Unc. β.

Factâ dissolutione calore leni, fiat colatura, *Oleumque* fervetur usui.

Oleum Hyperici compositum.

℞. *Summitatum & Florum Hyperici ad maturitatem seminis ferè accedentium lib. I.*
Olei veteris clari lib. II.
Vini odoriferi lib. I.

Macerentur tribus diebus ac noctibus, bulliant deindè in duplici vase, obturato orificio vasis ad *vini* consumptionem, postea exprimantur : *novas Summitates, Flores, & Vinum* in eodem *Oleo* macera, coque & cola ut ante, idque tertio fiat, tum forti expressioni adde

Terebinthinæ claræ lib. I.

Croci pulverisati scrup. IV.

Servetur ad usum.

Oleum Lumbricorum terrestrium.

℞. *Lumbricorum terrestrium vino albo submersorum* & *lotorum lib. II.*

Olei Olivarum lib. IV.

Bulliant ad consumptionem humiditatis colentur & exprimantur.

Oleum Mastichinum.

℞. *Olei Majoranæ lib. I.*

Mastichis electæ grosso modo contusæ Unc. III

Sola dissolutione *Mastichis*, lentissimo calore, sine ulla ebullitione paretur præstans *oleum*, quod colandum & ita servandum.

Oleum Myrtillorum.

℞. *Baccar. Myrti ruditer contusarum lib. β.*

Olei Omphacini lib. I. β.

Vini rubri austeri lib. β.

Coquantur ad consumptionem *vini*, colentur & exprimantur.

Oleum Mucaginum.

℞. *Rad. Althææ recentium Unc. XX.*

Scyllæ recentis in mortario marmoreo contusarum Unc. IV.

Sem. Fænugræci,

Lini integrorum an. lib. I.

Macerentur in f. q. aquæ; deindè leniter coquantur donec remittant crassam, & viscosam mucilaginem:

Cujus

Cujus per setaceum trajectæ lib. II.

Adde

Olei Anethini,

Chamæmelini,

Liliorum alborum an. Unc. XVI.

Coquantur simul ad humiditatis aqueæ consumptionem, subindè agitando ne adurantur.

Oleum Vulpinum.

℞. Vulpem (qua fieri potest) pinguem, ætatis mediæ, venatuque circa Autumnum captam.

Hanc occide, exentera, carnibusque post detractam pellem in frusta dissectis, fractisque singulis ossibus, adde

Vini albi, ℥

Aquæ fontis an. lib. X.

Salis marini Unc. III.

Summitatum Anethi,

Thymi,

Chamæpityos an. m. IV.

Coque diligenter despumando ad medias, mox fiat cum expressione colatura: eandemque recoque cum

Olei veteris optimi lib. IV.

Flor. Salviæ,

Roris marini an. m. II.

Absumptâ demùm aqueâ humiditate co-
lentur denuò; oleumque ab omni aquositate
immune servetur usui.

Olea per Destillationem.

Oleum Absynthii.

℞. Absynthij sicci q. v.

Maceretur aqua fontanâ Tartarifatâ per quatuordecim dies, vel sine maceratione additâ Salis communis *s. q.* destilletur per Vesicam, & exhibit aqua cum oleo, separatur oleum per infundibulum, vel vitrum separatorium dictum, & fervetur ad usum.

Eodem modo extrahitur:

*Oleum Herbarum Menthæ,
Rorismarini,
Rutæ,
Sabine,
Salviæ &c.*

*Florum Aurantiorum recentium,
Lavendulæ, &c.*

*Corticum Aurantiorum recentium,
Citri recentium, &c.*

Qui Cortices ab alba parte interiori separantur, contundantur, macerentur, postmodum destillentur ut suprâ.

Oleum Seminum Anisi.

℞. Sem. Anisi contusorum lib. II.

Aquæ fontanæ lib. XX.

Tartari albi crudi pulverisati Unc. II.

Macerentur per 24. horas, destillentur per Vesicam seu per Alembicum cum suo refrigeratorio. Oleo cum aqua extracto per infundibulum separato, aquam adhibe ad novam destillationem.

Eodem modo extrahitur:

Oleum ex sem. Anethi,

Carui,

Cumini,

Dauci,

Fœniculi, &c.

Ex Aromat. ut Cinnamomo,

Garyophyllis,

Macere,

Nuce Moschata, &c.

Ex lignis aromaticis, ut Sassafras,

Rhodio, &c.

Oleum ex Baccis Juniperi.

℞. Baccarum Juniperi recentium lib. L.

Contundantur & ponantur in vase terreo cum aquæ frigide lib. XXIV. & fermenti acrioris lib. I. Reponantur in cella (vase benè obturato) per tres menses; deindè distillantur per Alembicum, vel Vesicam cum aquæ simplicis convenienti quantitate. Post separationem olei per infundibulum, servetur aqua ad novam distillationem.

Eodem modo fit

Oleum ex Baccis Lauri,

Hederæ, &c.

Oleum Ceræ.

℞. Cerae flavae q. v

Liquefiat Cera, & à carbonibus, lateribus, vel globulis argillaceis ignitis imbibatur, qui indentur Retortæ, & extrahatur oleum in arena: quod cum copiosa aqua rectificetur.

Eodem modo destillari poterunt *olea ex Pinguedinibus*: nec non ex *Gummi & Resinis*, quæ in *pulveres* redigi non possunt. Ejusmodi sunt

Ammoniacum,
Caranna,
Opoponax,
Sagapenum,
Styrax liquida,
Tacamahaca, &c.

Oleum de Lateribus.

℞. Lateres aut Tegulas rufas antiquissimas, ex rufo luto ductas, easque confringe in frustra mediocria, & in prunis urito, donec excanduerint, Deindè à prunis exempta fragmenta extinguantur oleo claro veteri, illicò cooperiendo ne flammam contrahant, ac demittito, donec planè refrixerint, & oleo se impleverint, exempta terantur, pulverem hunc in Retortam ac Cucurbitam vitream luto Chymico lutatam indito, & jungatur Recipiens capax juncturis pariter luto obductis, ac per gradus ignis oleum elicitò: quod prolectum in Phiala diligenter obturata recondatur.

Oleum Myrrhæ per deliquium.

Aliquot Ovis ad duritiem coctis, & per mediam longitudinem incis, Vitelli eximantur: Tum albuminum cavitates Myrrhâ tritâ ad medietatem impleantur, & denudò

deuò conjungantur eorundem partes,
floque leviter constringantur & suspen-
dantur in cella : ut sic *Myrrhæ liquatus*
humor in fictile vel vitreum vas distillari
queat.

Oleum Terebinthinæ.

℞. Terebinthinæ q. v.

Destilletur per Vesicam affusâ aquæ
copiâ.



CLASSIS DUODECIMA.

De Unguentis.

Unguentum Ægyptiacum.

℞. *Æruginis subtiliter pulverisatæ Unc. V.*
Mellis Unc. XIV.

Aceti vini acerrimi Unc. VII.

Coquantur simul igne lento, donec fiat
Unguentum spissum & colore purpureum.

Unguentum Album.

℞. *Olei Rosati Unc. IX.*

Cerussæ pulverisatæ Unc. VI.

Ceræ albæ Unc. II. β.

Post liquefactam in oleo Ceram, tempe-
 stivè injice Cerussam, moveanturque con-
 tinuò, donec inspissentur, & fiat *Unguen-
 tum.*

Camphoratum fiet, si lib. I. Unguenti
 addas *Camphoræ Oleo Rosato tritæ drach. I.*

Unguentum Althææ.

℞. *Olei Mucaginum lib. IV.*

Ceræ flavæ lib. I.

Resinæ puræ lib. β.

Terebinthinæ Unc. II.

Pulv. rad. Curcumæ q. s. pro colore flavo.

Liquentur simul leni igne sine ullâ co-
 cione, & colatum per linum, Unguentum
 servetur usui.

Unguentum Apostolorum.

℞. *Olei olivarum communis lib. II.**Lithargyri auri drach. X.*Coque leni igne affusâ aquæpuræ f. q.
spatulâ continuo agitando ad unguenti
mollioris consistent. adde*Ceræ flavæ,**Resinæ an. drach. XIV.*Liquatis & adhuc tepentibus misce se-
quentia aceto acerrimo dissoluta, colata
& ad mellis consist. cocta*Gummi Ammoniaci drach. XIV.**Bdellij drach. VI.**Galbani,**Opoponacis an. Unc. β.*

Miscendo his

Terebinthinæ drach. XIV.

Tandem injice pulveres sequent.

*Aristolochiæ longæ,**Olibani an. drach. VI.**Myrrhæ Unc. β.**Æruginis drach. II.*

F. f. a. Unguentum.

Unguentum de Arthanitâ.

℞. *Succi Cyclaminis lib. II.**Fructuum & herbar. Cucumeris agrestis,**Butyri Vaccini an. lib. I.**Olei simplicis lib. II.**Pulpæ Colocynthis Unc. IV.**Polypodij Unc. VI.**Euphorbij Unc. β.*Contundenda terantur & macerentur in
Succis

Succis & Oleis per octiduum in vase vitreato probè obturato; postea coquantur ferè ad consumptionem humiditatis, fiatque colatura & expressio fortis, in expresso oleo liquefac

Ceræ flavae Unc. V.

Tum,

℞. *Gummi Sagapeni Unc. I.*

Myrrhæ pulverisatæ drach. III.

Solvantur in mortario calido pistillo calido cum q. s. *Aceti*, teranturque diligenter, donec grumi non appareant, ad formam mellis, his adde

Fellis Taurini ad mellis spissitudinem in Balneo cocti drach. VII.

Ac cum prædicto oleo in quo *Cera* fusa est probè misceantur, quibus continuò motis, insperge paulatim pulverem subsequentium medicamentorum,

Scammonij,

Aloës,

Colocynthidis,

Mezeræonis,

Turbith an. drach. VII. & β.

Salis Gemmæ drach. IV. & β.

Euphorbij,

Piperis longi,

Zinziberis,

Chamæmeli an. drach. III.

Fiatque *Unguentum* s. a.

Unguentum Aureum.

℞. *Olei veteris & clari lib. II.*

Ceræ Citrinæ lib. β.

Tere-

Terebinthinae Unc. II.

Resinae Pineae,

Colophoniae an. Unc. I. β.

Thuris,

Mastiches an. Unc. I.

Croci optimi triti drach. I.

Liquefiant in *Oleo*, *Cera*, *Terebinthina*,
Resina, *Colophoniam*: defervescentibus ad-
dantur *pulveres Thuris* & *Mastiches*, *Cro-*
cus ultimò inspergatur, & rudicula diligen-
ter misceatur, fiatque *Unguentum*.

Unguentum Basilicon.

℞. Picis Navalis,

Resinae Pini,

Sevi Vaccini,

Cerae Citrinae an. lib. I.

Olei communis lib. II.

Liquata commisceantur, & f. f. a. *Un-*
guentum.

Unguentum Enulatum cum Mercurio.

℞. Pulpa radicum Enulae campanae ex aqua
communi coctae lib. I.

Pulpa radicum Oxylapathi, eodem modo
coctae lib. β.

Misceantur. & superaffunde

Aceti vini Unc. IV.

Recoquantur ad humiditatis evapora-
tionem; dein fume

Axungiae Porcinae veteris,

Olei veteris an. Unc. IV.

Terebinthinae decocto praescriptarum ra-
dicum lotae Unc. III.

Cerae

Ceræ flavæ Unc. I.

Salis communis optimè triti,

Aluminis an. Unc. β.

Pulv. Rad. Hellebori albi,

nigri an. drach. II.

Hydrargyri succo Limon. extincti Unc. II.

Axungia, Ceræ, & Oleo liquefactis, adde Pulpas Enulæ & Oxylapathi, Salemq̃ue & alios pulveres immisce, ultimò Hydrargyrium non solùm succo Limonum, sed etiam totâ Terebintbinâ ad hoc asservatâ, & Axungia parte in mortario lapideo indefessa agitatione extinctum.

Paretur cum & sine Mercurio.

Unguentum de Glycyrrhiza.

℞. Glycyrrhizæ recentis ac succulentæ Unc. II.

Butyri recentis aquâ Rosarum & Solatri aliquoties loti lib. β.

Pistentur simul in mortario; postea frigrantur in sartagine, colentur & exprimantur, hocque tertio iteretur, reassumptâ semper novâ Glycyrrhizâ: tunc sume

Cerussæ mundissimæ pulverisatæ Unc. I. β.

quæ cum Aceti distillati Unc. VI. coquantur ad pultis formam, & Butyro jam præparato commixta diu multumque agitetur.

His adde

Pompholygos drach. II.

Albuminis Ovi conquassati, & in liquorem aquæ instar resoluti drach. VI.

Camphoræ oleo Amygdalarum tritæ scr. I.

Fiat f. a. Unguentum.

Unguentum Martiatum.

- ℞. Herb. Absinthij,*
Abrotani,
Basilici,
Calaminthæ,
Centaur. min.
Chamædryos,
Costi Hortensis,
Majoranæ,
Menthæ aquat.
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci an. Unc. I. β.
Fol. Lauri,
Rorismarini,
Ruthæ an. Unc. III.
Sem. Cumini,
Fœnugraci,
Urticæ maj. an. Unc. β.

Omnia minutim incisa & contusa coquantur cum Axungię porcine lib. IV.

Expressis & ab humiditate separatis adde

Olei Nucis Moschatæ expressæ &

Tesselatim incisi Unc. I.

Ac ubi ab igne refrixerint

Styracis liquidæ Unc. III.

F. f. a. Unguentum.

Unguentum Neapolitanum.

℞. Axungię Suille recentis non salitæ, à
membranis probè purgatæ lib. I.

Succi Salviæ Unc. IV.

Bulliant simul lento igne ad succi consumptionem.

sumptionem, in colatura liquefac

Cerae flavae,

Olei Laurini an. Unc. I.

His ab igne semotis & frigefactis im-
misce exactissimè in mortario

Mercurij crudi Unc. IV.

*Styracis liquidæ, cum Unc. I. Terebin-
thinæ solutæ, Unc. β.*

Olei Guajaci drach. II.

Fiat ex arte Unguentum.

Unguentum Nervinum.

℞. Herb. recent. Salvia,

Ivæ Artheticae,

Majoranae,

Rorismarini,

Menthae,

Ruthæ,

Paralyseos cum flore,

Flor. recent. Lavendulae,

Hyperici,

Chamomilla,

Meliloti,

Summitatum Anethi recentium an. m. I.

Baccarum Lauri,

Juniperi an. Unc. I.

Radicum Pyrethri drach. II.

Incisa & contusa, immergantur in

Oleorum Lumbricorum,

Vulpini,

Anethini,

Hyperici an. Unc. III.

Terebinthinae Unc. I.

Axungia Humana,
Cati sylvestris,
Canis an. Unc. β.

Macerentur per septimanam unam vel alteram, postea in Cucurbita semel atque iterum ebulliant, exigua, quæ prodiit, humiditate *herbis & oleis* reaffusâ: tum fortiter exprimantur & colentur, in *expresso ac colato* dissolve

Masticis optimè pulverisatæ Unc. β.

Terebinthinæ Unc. IV.

Ceræ Unc. III.

Benzoini in unciis duabus Spiritûs vini rectificatissimi dissoluti drach. VI.

Et conficiatur Unguentum.

Unguentum Nutritum.

℞. *Lithargyri auri tenuissime lævigati lib. β.*

Olei Olivarum lib. II.

Aceti vini q.s. ad nutriendum in mortario.

F. s. a. Unguentum.

Unguentum Populeon.

℞. *Oculorum Populi arboris recentium & contusorum lib. III.*

Axungia Porcinæ recentis fusæ & colatæ lib. VI.

Mixta simul macerentur, donec *Herbæ sequentes* sub initium æstatis colligi possint.

Tunc,

℞. *Fol. Bardanæ,*
Hyosciami,
Lactucæ,
Mandragoræ,
Papaveris nigri,

Sedi majoris,

minoris,

Solani,

Umbilici Veneris, ejus loco Crassula,

Cymarum Rubi teneriorum an. m. VI

Contusa omnia commisceantur *Axungia* & oculis *Populi*: post aliquot dies adde
Succi Solatri, lib. I.

Coquantur ad humiditatis consumptionem; colentur & exprimantur.

Post annum invalidum redditur hoc Unguentum, aut contrariarum virium; eò quod facile rance scat.

Unguentum Rosatum.

R. Axungia Porcina recentis purgata & candida q. v.

Cui admisce

Rosarum recentium mundatarum & modicè in pilâ lapideâ contusarum quantum Axungia capere potest.

Macerentur per aliquot dies; tum colliquantur & exprimantur: addendo denuò *Rosas recentes*, hocque tertiò. In fine decoquantur ad humiditatis consumptionem, etiam affundendo

Aqua Rosarum lib. I.

Post refrigerationem ducatur pars venditioni exponenda pistillo ligneo in vase marmoreo, superaffusâ aquâ *Rosaceâ* & Unguentum erit gratiosum & candidum.

Balsamum Arcæi.

- ℞. *Terebinthinæ Venetæ*,
Gummi Elemi an. Unc. I. β.
Sevi Castrati Unc. II.
Axungię Porcinę veteris, & insulsę
Unc. I.

Ex omnibus simul liquatis & colatis,
 fiat ex arte Unguentum.

Balsamum Lucatelli.

- ℞. *Olei Olivarum optimi lib. III.*
Terebinthinæ in aqua rosar. lotæ Unc. VIII
Ceræ lib. I.
Santali rubri pulveris. Unc. II.
Vini Hispanici q. s.
 Coque f. a. addendo circa finem
Balsami Peruviani Unc. I.

Balsamum Viride.

- ℞. *Ol. Olivar.*
Lini an. Unc. IV.
Laurini, Unc. β.
Juniper. drach. II.
Garyopill. drach. β.
Aloës, drach. I.
Terebint. Venet. Unc. I.
Virid. eris drach. II.
Vitriol. albi scrup. IV.
 F. f. a. Balsamum.



CLASSIS DECIMA-TERTIA.

De Ceratis & Emplastris.

Ceratum de Crusta panis.

℞. *(Crustæ panis tostæ, & in Aceto mace-
ratæ Unc. II.*

Oleorum Mastichini,

Cydoniorum an. Unc. I.

Pulveris Mastiches,

Menthæ,

Spodij,

Coralli rubri,

Santali albi,

rubri an. drach. I.

Farinæ Hordei quantum sufficit.

Fiat Ceratum, semper recens præparandum.

Ceratum defensivum.

℞. *Olei Rosati,*

Aceti Rosati an. Unc. VI.

Bulliant simul continuò agitando ad
consumptionem *Aceti*, & in *Oleo* liquentur
Ceræ albæ Unc. VI. quibus tepidis immisce
sequentia pulverisata:

Boli Armeni,

Terræ sigillatæ an. Unc. II.

Sanguinis Draconis Unc. I.

Balaustiorum Unc. ℥.

Et f. s. a. Ceratum.

Em-

Ceratum Matricale.

- ℞. Galbani Aceto soluti & cocti Unc. I. ℞.
 Tacamahacæ,
 Assæ foetida an. Unc. ℞.
 Myrrhæ rubræ drach. II.
 Pulveris Matricariæ,
 Arthemisæ an. drach. ℞.
 Bdellij mollis drach. I.
 Pulveris Lapidis magnetis scrup. IV.
 Seminis Dauci Cretici scrup. I.
 Olei Succini guttulas aliquot.
 In Vino albo Gummata dissolvantur, &
 additâ Cerae sufficienti quantitate, f. f. a.
 Ceratum.

Ceratum Santalinum.

- ℞. Rosarum rubrarum drach. XII.
 Santali rubri drach. X.
 albi,
 citrini an. drach. VI.
 Cerae albæ drach. XXX.
 Eboris drach. VII.
 Camphoræ drach. II.
 Olei Rosati lib. I.
 Misce, & f. f. a. Ceratum.

Ceratum Stomachicum.

- ℞. Mastiches Unc. ℞.
 Tacamahacæ,
 Ladani an. drach. II.
 Balsami Indici veri drach. I.
 Terebinthinæ Venetæ,
 Cerae albæ an. q. s.
 Misce, & f. f. a. Ceratum.

DE E M P L A S T R I S.

Emplastrum album coctum.

℞. *Olei Olivar.*

Cerussæ an. lib. l.

Aquæ fontis q. s.

Coque ad Emplast. consist. addendo

Ceræ albæ Unc. II.

Misce f. Emplastrum.

Emplastrum de Baccis Lauri.

℞. *Baccarum Lauri mundatarum Unc. II.*

Thuris,

Mastiches,

Myrrhæ an. Unc. I.

Olei Laurini drach. VI.

Terebinthinæ parùm coctæ Unc. I. s.

Cyperì,

Costi an. Unc. I.

Foliorum Rutæ siccorum drach. III.

Sem. Cumini,

Fœniculi an. drach. II.

Mellis despumati quantum satis.

Misce, & f. f. a. Emplastrum.

Emplastrum de Betonicâ.

℞. *Herb. Betonicæ,*

Plantaginis,

Apij,

Verbenæ,

Pimpinell. an. m. s.

Incis. & contusis coque leniter cum

Ceræ

Cerae flavae Unc. IV.

Resinae Pini lib. β.

Colophon. Unc. β.

Colat. Express. adde

Terebinth.

Gummi Elemi an. Unc. II.

Mastic. drach. β.

F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Carminativum.

℞. *Gummi Galbani*,

Bdelyj,

Ammon. an. Unc. β.

Thuris masculi,

Myrrhae rubrae an. drach. II.

Opii Thebaici drach. I.

Dissolve in Aceto Scyllitico iterumque
inspissatis adde

Cerae citrinae,

Colophonae an. drach. III.

Balsami Peruv.

Ol. Philosoph. an. drach. I.

Terrae drach. β.

Carni stillat. scrup. β.

Terebint. Venet. q. s.

F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Althææ.

℞. *Rad. Althææ pulveris* lib. β.

Olei Camomillæ,

Anethini an. Unc. II.

Rosarum,

Adipis anatis an. Unc. I.

Olei Liliorum albor. drach. X.

Emplast. Diachyl. cum gum. Unc. III. β.
Medullæ Vituli,

Vaccæ an. drach. VI.

Adipis Vaccæ Unc. III.

Ceræ flavæ Unc. IX.

F. f. a. *Emplastrum.*

Emplastrum de Cicutâ.

℞. *Cicutæ recentis parum contus. q. s.*
Sevi Ariet.

Resinæ,

Resinæ Pini an. Unc. IX.

Ceræ citrinæ Unc. VI.

Coq. simul ad humid. consumpt. colat.
 fortiter expressæ adde

Gummi Ammoniaci,

Terebint. Venetæ an. Unc. IV.

F. f. a. *Emplastrum.*

Emplastrum Dia-Palma.

℞. *Litargirij auri,*

Olei Olivarum an. lib. III.

Axungie Porci lib. II.

Aquæ communis in quâ Salis comm. Unc. I.
soluta est q. s.

Coque f. a. continuò spatulâ palmæ
 agitando donec digitis non adhæreant adde

Vitrioli albi Unc. IV.

Misce fiat *Emplastrum.*

Emplastrum Dia-chylon simplex.

℞. *Olei Mucaginum lib. III.*

Lithargyri auri lib. I. β.

F. f. a. *Emplastrum.*

Emplastrum Dia-chylon cum gummis.

℞. *Olei Mucaginum lib. VIII.**Lithargyri auri lib. IV.*℞. *Cerae,**Terebinthinae an. lib. β.**Ammoniaci,**Galbani,**Opoponacis,**Sagapeni an. Unc. IV.*

F. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Dia-phoreticum.

℞. *Gummi Ammoniaci Unc. II.**Elemi Unc. I. β.**Sagapeni Unc. I.*Solvantur in f. q. *Aceti* ad pultis formam,
cui adde pedetentim & quasi guttatim*Cerae flavæ odoratæ lib. I.**Terebinthinae claræ Unc. III.**Colophoniae, seu Picis Græcæ Unc. IV.*Liquata invicem leni igne, in Sartagine
separatim, & non nimis calidè superiori-
bus *Gummatibus* sensim & alternatim, uti
dictum, sub continuâ agitatione infusa;
hinc alternatim etiam inspergantur succes-
sive hi pulveres: utpote*Pulveris Gummi Bdellij Unc. IV.**Succini Citrini Unc. III.**Olibani,**Mastiches an. Unc. I.**Sandaracis drach. VI.*Post agentur, donec omnia commixta,
atque dextrè unita sint. per horam inte-

120 PHARMACOPOEA
gram in diplomate, vase scilicet duplici
calore leni: fiatque Emplastrum.

Emplastrum Dia-pompholygos.

℞. *Olei Rosarum cum succo Solatri cocti &*
præparati Unc. X.

Ceræ albæ Unc. VIII.

Liquefcant lento igne, remotis ab igne
insperge pulveres sequentes:

Pompholygis præparatæ,

Tutiae præpar.

Plumbi usti & loti an. Unc. II.

Cerussæ lotæ Unc. IV.

Thuris masculi Unc. I.

Moveantur continuò ad refrigeratio-
nem, & f. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Divinum seu Manus Dei.

℞. *Olei Olivæ lib. I.*

Lithargyri aurei lib. β.

Aquæ comm. q. s.

Coque ad consistentiam Emplastri cui
adde

Ceræ flavæ Unc. IV.

Gummi Ammoniaci,

Galbani colat. & inspiss. an. Unc. I.

Terebint. Unc. I. β.

Olei Laurini drach. VI.

Tum insperge pulveres sequentes

Myrrhæ,

Masticæ,

Olibani an. Unc. I.

Lapid. Calamin.

Magnetis,

Rad. Aristoloch. longæ,
rotundæ,
Viridis æris an. Unc. ß.
 Misce f. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Epispasticum.

℞. *Ceræ citrinæ Unc. I.*
Terebinth. Unc. II. in æstate Unc. I. ß.
Picis albæ Unc. I.
Cantharid. pulveris. Unc. II.
 F. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Filii Zachariæ.

℞. *Ceræ flavæ,*
Medullæ cruris Vaccæ,
Adipis Anatis,
Gallinæ,
Mucilaginis sem. Lini,
Althææ,
Fœnugræci an. lib. I.
Olei Lini q. s.
 Fiat Emplastrum.

Emplastrum de Galbano.

℞. *Galbani in Aceto dissoluti Unc. I.*
Picis navalis Unc. ß.
Emplastri Dia-chylonis simplicis drach. II.
Salis Armoniaci scrup. II.
 Misce, & fiat Emplastrum.

Emplastrum Gratia Dei.

℞. *Ceræ,*
Resinæ an. lib. I. ß.

Tere-

Terebinthinæ Unc. X.

Mixta simul liquefiant & paululum refrigerescant, tunc adde

Olibani pulverisati Unc. VI.

Misce, & cum *Oleo Rosaceo* fiant *Magdaleones*.

Emplastrum Gryscum seu de Lapide Calaminari.

℞. *Lapidis Calaminaris usti*, & *Aceto vini extincti*, & *suprà Porphyritem præparati Unc. I.*

Litargyrii auri Unc. II.

Cerussæ Unc. β.

Tuticæ præparatæ drach. III.

Terebinthinæ drach. VI.

Ceræ albæ Unc. I. β.

Sevi Cervini Unc. II.

Thuris electi drach. V.

Mastiches drach. III.

Myrrhæ drach. II.

Camphoræ drach. I. β.

Confice s. a. Emplastrum.

Emplastrum ad fracturas Ossium.

℞. *Rad. & Fol. Consolidæ maj. m. II.*

Althææ,

Bacc. Mirthi an. Unc. β.

Fol. Hyperic.

Salicis an. m. I.

Coq. in s. q. aquæ Chalyb. ad lib. I.

Colat. fortiter expressæ & Mucilaginosum adde

Sevi

Sevi Hircini,
Olei Rosarum,
Myrtillor. an. lib. ꝑ.

Quibus liquatis adde
Lythargirij auri lib. ꝑ.
Minij Unc. II.

Coque ad consistentiam Emplastri tenuioris tum in eo liquef.

Cerae flavae Unc. IV.

Terebint. Unc. II.

Addendo pulveres sequentes

Boli Armeni,

Terræ sigillatæ,

Olibani,

Mirrhae,

Masticis an. Unc. I. ꝑ.

Sanguinis Draconis Unc. I.

F. f. a. Emplastrum.

Emplastrum Magneticum Arsenicale.

R. Gummi Sagapeni,
Ammoniacy,
Galbani an. Unc. III.

Cerae,

Terebint. an. Unc. IV. ꝑ.

Magnetis Arsenicalis Unc. III.

Terræ Vitrioli lotæ Unc. I.

Olei Succini Unc. II.

Misce f. f. a. Emplastrum.

Magnetem Arsenicalem sic conficies

R. Antimonij crudi,
Sulphuris flavi,
Arsenici Crystallini an. Unc. II.

Pulve-

Pulveris. omnia subtiliter, & in vase vitreo in arenam calentem imponantur, & tamdiu in illa reliquantur donec materia ista omnis colliqueſcat id quod inde cognoveris ſi materies ſtylo ferreo tacta illi adhæreſcat & *Terebinthinæ* inſtar ductitetur colore eſt rubea, ſub obſcura poſtea inſrigidatur: deinde rupto urinali eximitur materia quæ in unam maſſam concurrit & dura eſt inſtar picis.

Emplaſtrum de Meliloto.

℞. *Meliloti Unc. VI.*

Florum Camomillæ,

Comarum Abſinthij,

Sampſuchi, id eſt, Majoranæ,

Baccarum Lauri,

Radicis Althææ an. drach. III.

Sem. Apij,

Ameos,

Cardamomi,

Ireos,

Cyperij,

Spicæ,

Cassiæ lignæ an. drach. I. β.

Ammoniacy drach. X.

Styracis Calamitæ,

Bdellij an. drach. V.

Terebinthinæ Unc. I. β.

Ficus pingues coctos, & cribratos N. XII.

Sevi Caprini,

Reſinæ an. Unc. II. β.

Ceræ Unc. VI.

Olei

Olei Sampsuchini,
de Spica an. Unc. I.

Decoctionis Meliloti, Camemeli & Fœ-
nugræci q. s.

Misce, & fiat Emplastrum. Parandi
 sunt *Magdaleones* crassi, ne exsiccentur.

Emplastrum de Mucilaginibus.

℞. *Mucaginum sem. Althææ,*
Lini,

Fœnugræci,
Corticis Mediani Ulmi an. Unc. IV.

Oleorum Camemelini,
Liliorum,

Anethini an. Unc. I. ℞.

Ceræ Citrinæ Unc. XX.

Gummi Ammoniacy,

Galbani,

Sagapeni,

Opopanacis Aceto solut. an. dr. VI

Terebintbinæ Gummis colatis
mixtæ Unc. II. ℞.

Croci drach. II.

Et f. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Oxycroceum.

℞. *Colophonie,*

Picis nigre,

Ceræ flavæ an. lib. ℞.

Liquefcant simul lento igne, & ab igne
 subductis immisce diligenter,

Ammoniacy,

Galbani, Aceto maceratorum, coctorum,
 &

Et admellis consist. evapor. an. Unc. II.
Terebinthinæ Gummatibus prædictis im-
mixtæ Unc. III.

Postea insperge sequentia tenuissimè
pulverata:

Croci Unc. I.
Olibani,
Mastiches,
Myrrhæ an. Unc. II.

F. s. a. Emplastrum.

Emplastrum Stipticum paracelsi.

℞. Minij,
Lapidis Calaminaris an. Unc. I.
Lithargyri auri,
argenti an. Unc. II.
Olei Lini Unc. III.
Olivarum Unc. IV.
Laurini,
Juniperi, an. drach. II.
Ceræ,
Colophonice an. Unc. II.
Gummi Opoponacis,
Galbani,
Sagapeni,
Ammoniacy an. Unc. β.
Vernicis, seu Sandaracis,
Terebinthinæ an. Unc. I.
Bdellij Unc. β.
Carabes Citrinæ,
Olibani,
Myrrhæ Alexandrinæ,
Aloës Epaticæ,
Aristolochiæ longæ,
rotundæ an. drach. I. β.

Mumia Transmarinae,
Magnetis Oleo Martis præparati,
Hematites an. drach. II.
Coralli rubri,
 albi,
Matris perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ sigillatæ,
Vitrioli albi an. drach. I. ß.
Florum Antimonij,
Croci Martis adstringentis an. scrup. II.
Camphoræ drach. I. ß.
 Misce & f. f. a. Emplastrum

Emplastrum Vigonium, seu de Ranis
 cum Mercurio.

R. *Ranas aquaticas viventes N. VI.*
Lumbricorum terrestrium vino albo lotorum
 & submersorum Unc. III. ß.
Vini albi lib. II.

Infundantur simul per aliquot horas, tum
 bulliant igne moderato ad tertiæ partis
 consumptionem, addendo sub finem

Matricariæ cum floribus,
Schœnanti,
Stœchados Arabicæ ana m. I.

Posteà adjice

Olei Camamelini,
Anethini,
Liliorum alborum an. Unc. II.

Axungie Porci lib. I.
Pinguedinis Vitulinæ lib. ß.

Bulliant rursus omnia ad vini tertias,
 cola-

colaturæ fortiter expressæ adde

Succ. Radicum Ebuli,

Helenij an. Unc. II.

Quibus mixtis, & sensim affusis, nutriantur.

Litargyrij auri tenuissimè triti lib. I.

Et coquantur simul lento igne, donec eam consistentiam acquirant, ut digitis non adhæreant, tum adjice, ut liquecant,

Ceræ Citrinæ Unc. VI.

Axungie Viperinæ (si desit) Taxi Unc. II. β.

Olei Laurini Unc. I. β.

His ab igne semotis & tepidis, adde

Olei de Spica Unc. II.

Olei Crocini sup. Classe XI. descripti Unc. I

Olibani pulverisati drach. X.

Euphorbij pulverisati drach. V.

Postremò immisce

Terebinthinæ claræ Unc. II.

Styracis liquidæ Unc. I. β.

Hydrargyrij Terebinthinâ extincti, & Styraçi prædictæ immixti Unc. IV.

Misce, & fiat ex arte Emplastrum, quod cum & sine Mercurio à Pharmacopœo reservari debet.

Spannadrapium ad Fonticulos.

℞. *Emplastri Palmei,*

Dia-chylonis simplicis.

de Cernuâ coctâ,

Ceræ an. lib. I.

Cinnabaris,

Put

Pulveris Ireos subtilissimi an. Unc. IV.

Moschi Olei Amygdalarum soluti gr. VIII.

Fundantur & misceantur f. a. imbibe
telis pro Spannadrappio.

Spannadrappium Marchionis d'Este.

R. Olei Olivarum,

Litargyrj auri an. lib. β.

Coquantur ad nigredinem, & adde

Ceræ flavae,

Picis nigrae,

Emplastri Dia-chalciteos an. lib. β.

Omnia probè misceantur, iisque adhuc
calentibus tela tenuis immergatur, & f. f. a.
Spannadrappium.





CLASSIS DECIMA-QUARTA.

*De Præparationibus simplicium
Medicamentorum usualium.*

PRæparata officinarum communiter, & in ipſe ſie dicta, nihil aliud ſunt, quàm ſimplicia nonnulla duriuſcula in tenuiſſimum pulverem, accedente aliquâ aquâ cordiali, redacta talia ſunt: *Terræ, Lapides, Perle, Corallia, Cruſtacea ſeu Teſtacea.*

Modus præparandi.

Rem præparandam læviga ſuper Porphyrite lapide verſatili quàm minutiffimè; inter lævigandum aſperge aquam aliquam Cordialem (*Putæ Roſarum, Borruginis, Meliſſæ & ſimilium*) ut fiat inſtar *Pultis*, hanc expone loco tepido, vel aëri, ut in umbrâ exſiccetur.

Nota. Quæ ſolidiora & duriora, adeòque minùs lævigabilia ſunt, uſtione antegreſſâ calcinari, friabiliaque reddi ſolent, ut *Cornua, Oſſa, Cruſtacea & ſimilia.*

Uſitatoria ſunt

Præparationes *Cinnabaris,*
Conchæ,

Coral-

Corallorum alborum,
rubrorum,

Cornu Cervi usti,

Chel. Cancror.

Crystalli,

Granati,

Hematitis,

Hyacinthi,

Lapidis Armeni,

Calaminaris,

Judaici,

Lazuli,

Magnetis,

Margaritarum,

Matris Perlarum,

Oculorum Cancri,

Ovorum Struthij,

Saphyri,

Smaragdi,

Spodij,

Tutiae,

Nota. Quod ad confectionem Alkermes
Lapis Lazuli uratur in crucibulo postea ut
 supra terendo & lævigando in tenuissimum
 pulverem redigatur.

Aluminis ustio.

R. *Aluminis Rochæ quantum volueris.*

Indatur vasi figulino non vitreato, &
 igne circumquaque accenso, aduratur do-
 nec ampullas ampliùs non emittat.

Butyri Majalis præparatio.

℞. *Butyri insulsi sub mensis Majj finem confecti q. v.*

Indatur vali terreo vitreato, & Balnei vel Solis calore lique scat: supernatans Butyrum per inclinationem separetur à sero subsidente; & Colatum, idoneò loco sine sale recondatur, in annum usum.

Cochlearum Testarum præparatio.

℞. *Cochlearum oblongas Testas*, quæ propè piscinas & lacus reperiuntur, his affunde *Acetum distillatum*, stent in infusione per noctem ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrasdes, postea pulverisa, & cum aqua *Cardui Benedicti* in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus nullius est pretii, nec operationis in usu.

Cornu Cervini spagyrica præparatio.

Calcinatio hæc commodè in Vesica perficitur coctione continuâ mediante distillatione aquarum *Acetosæ*, *Cardui Benedicti*, *Calendulæ*, *Scorzonerae* & similium, per cujus vaporem *Apices Cornu* in collo Alembici quâ parte attingi & penetrari queant, suspensi, jucundo & miro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis vires aliàs exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet) mollescant &

& calcinentur secundum artem, & ferventur ad usum.

Millepedum præparatio.

℞. *Millepedum vivorum* q. v.

Diligenter à fordibus purgentur deinde *Spiritu vini dephlegmato* inebrientur, & calore moderato siccentur.

Opii Correctio præparatio.

Opium frustulatum & in teneras lamellas conscissum collocetur supra laminam ferream, quam super carbones accensos leniter incallescere, & *Opij sulphur Narcoticum* sensim exhalare sine, quousque non amplius fumum vel vaporem emittat, cavendo tamen ne comburatur; sed ut solummodò torrefiat, & hæc facilis est & compendiosa, genuina tamen *Opij* præparatio.

Plumbi ustio.

℞. *Plumbi* q. v.

Liquefcat in fictili novo & injice *Sulphuris pulverisati* q. s. ignem succendito flagrans plumbum spatulâ ferreâ versetur donec prorsus in cineres redigatur.

Scammonii præparatio.

Scammonium super cartam bibulam ex-

pansum fumo sulphuris suffumigetur, id studiose cavendo ne lique scat sed lentissimo calore fumo sulphuris imbuatur.

Tuthiæ præparatio.

℞. *Tutiæ officinarum*, seu *Cadmia Græcorum quantum volueris.*

Ter saltem in Crucibulo candefacta, ter aquâ *Rosarum* & *Plantaginis* extinguitur, deindè super marmor in subtilissimum pollinem lævigata, cum aquâ *Plantaginis* & *Rosaceâ* redigatur in pastillos.

Plures aliorum simplicium utpote *Radicum seminum* & similium præparationes variis in dispensatoriis reperiuntur quorum nonnullas, tamquam inutiles & non necessarias refutamur nonnullas vero Medicorum judicio & præscriptioni relinquimus.





CLASSIS DECIMA-QUINTA.

*De quibusdam Medicamentis
spagyricis.*

Crocus Martis adstringens.

℞. *L* *Imaturæ Chalybis* benè *depuratæ* *tenuioris lib. ℥.*

Extende super Tegulam latam & planam, exponendam igni *Figulino*, aut *Reverberij*, spacio octo vel decem dierum, sic ut Tegula à flammâ continuâ, continuò ardeat, & limatura reducetur in pulverem inpalpabilem, spongiosum, subrubrum, usui reponendum.

Crocus Martis cum Sulphure
præparatus.

℞. *Sulphuris Magdalen* applica ignito *Chalybis Bacillo*, ut candentes & liquecentes guttæ in subjectam pelvim aquâ frigidâ plenam incidant: repete illum laborem ad *Chalybis* totalem fusionem, decanta postea aquam, & igniatur repertus pulvis in Crucibulo, reverberandus ad *Sulphuris* consumptionem, & usui, dum refrixerit, reponendus.

Magisterium Martis aperitivum.

℞. *Succi Oxalydis recenter expressi* & per
subsidentiam depurati lib. VIII.

Pulpæ Tamarindor. pinguium Unc. XVI.

Confricentur manibus, vel pistillo ligneo
 in patina terrea, non stannea, & fiat instar
Pulmenti, postea coquatur parùm, & cla-
 rificetur per laneum pannum, clarificatum
 indetur Cucurbitæ vitreæ, cui adde *Lima-
 turæ Chalybis à sordibus benè purgatæ Unc.
 VIII.* digerantur in arena loco calido per
 quatuor vel quinque dies & noctes, Cu-
 curbitæ superponatur Alembicus cæcus, ut
 materia per intervalla agitari possit spatulâ
 ligneâ, per digestionem coletur per char-
 tam emporeticam in patinam vitream vel
 terream, deindè inspissetur lento igne ad
 consistentiam Extracti liquidioris. Resi-
 duum *Chalybis* in subtilissimum pulverem
 redactum, exsicceetur & usui servetur.

Tinctura Martis aperitiva.

℞. *Limaturæ Chalybis per abluionem pu-
 rificatæ lib. ß.*

*Tartari albi Germanici Crystallini præ-
 parati & pulverisati lib. II.*

Misce exactè, & inde ollæ ferreæ valdè
 capaci & magnæ, addendo *Aquæ pluvialis
 purissimæ lib. XXIV.* (observando, ollam
 ultra medietatem non esse replendam, alio-
 quin materia, quæ bulliendo intumescit
 &

& inflatur, majori ex parte parietes ollæ tranfiliret) bulliant omnia benè per integrum diem, addendo per intervalla aquam bullientem (quæ in defectu præcedentis, ſemper debet eſſe ad manum) comino-veatur continuò materia, quæ alioquin ſemper albicans apparebit. Poſt duodecim horarum ebullitionem, quod craſſius eſt, ſubſidebit, ſubtilius verò ſupernatabit nigricantem præ ſe ferens colorem ſaporis dulcacidi: decanta quod clarum erit, fil-tretur, & in vaſe terreo vitreato evapore-tur lento igne ad conſiſtentiam Syrupi liquidioris.

Vitriolum Martis.

R. Spiritus Vitrioli rectificati lib. III.

Aquæ pluvialis lib. IX.

Misce, tum accipe

Limaturæ Chalybis puriſſimæ lib. I.

Projice *Limaturam* in Matraceutiam vi-treum amplum, & pedetentim ſuperaffun-de tres partes ſuperioris mixturæ, *Spiritus* & *Aquæ* ſcilicet. Digerantur ſuper cineres calidos per tres dies; tum liquorem viri-dem per declinationem decanta in alio vi-tro, & ſi ex *Limatura* quidquam indifſo-lutum reſtitet, illi reliquam partem diſſol-ventis adde, & digere ſuper cineres, ut dictum eſt: deindè decanta, & junte pri-mæ diſſolutioni, rejiciantur verò ſæces tamquam inutiles. Fil-trentur omnes diſſo-lutiones, & evaporentur in vaſe vitreo igne
len-

lento, ad consumptionem medietatis, deindè ponantur in cellâ vinariâ, vel loco frigido per tres dies, tum collige *Crystalllos Vitrioli*, reliquam humiditatem decanta, evapora, & crystallisa, ut supra. Postea exsicca *Crystalllos*, & usui serva in vitro benè obturato.

Saccharum Saturni.

℞. *Cerussæ optimæ q.v.* (Belgicè Schelp-wit)

Huic subtilissime pulverisatæ affunde Acetum stillatitium ad supereminentiam trium vel quatuor digitorum transversorum: stent in digestionem donec Acetum dulce factum fuerit: dein Aceti decantati levi igne fiat evaporatio ad cuticulæ apparentiam sic in loco frigido concrepescunt Crystalli in umbra exsiccandi: reliquum denuò ad cuticulæ apparentiam exhalet & procede ut ante.

Mercurius sublimatus Corrosivus.

Hunc aliunde petere licet.

Mercurius dulcis.

℞. *Mercurij sublimati Unc. VI.*

Mercurij vivi Unc. IV.

Misce exacte in mortario marmoreo usque dum Mercurius vivus planè dispareat. Pulvis hic indatur matraccio colli oblongi in arenâ positi & successivis ignis gradibus

Mer-

Mercurius elevetur in altum. Materia autem exempta denuò sublimetur idque toties repetatur donec Mercurius sit planè insipidus rejiciendo semper pulverem rubrum in fundo matræ hærentem.

Mercurius præcipitatus albus.

R. Mercurij crudi Unc. I.

Aquæ fortis Unc. I. β.

Stent in loco calido donec Mercurius solutus sit atque in totum dispereat. Solutionem hanc stillatim cum muriâ forti confundito. Sic præcipitabitur pulvis albus Aquâ calidâ crebro abluendus donec omnem acrimoniam deposuerit & blando calore inter chartas complicatas exlicetur.

Mercurius præcipitatus ruber.

R. Mercurij crudi Unc. I.

Aquæ fortis Unc. I. β.

Detineantur super arenam in phialâ vitreâ donec Mercurius sit solutus dein valido igne s. evaporatio ad siccitatem.

Mercurius præcipitatus Viridis.

R. Mercurij Unc. IV.

Veneris Unc. β.

Solve separatim in aquâ forti vel Spiritu nitri & misc. postea abstrahere aquam fortem digere præcipitatum cum Aceto stillatio filtra & sicca s. a.

Tur.

Turpethum Minerale.

℞. Mercurij crudi Unc. IV.

⁊ Olei Vitrioli Unc. XVI.

Misceantur retortæ vitreæ imponantur & simul macerentur per viginti quatuor horas super cineres calidos quibus elapsis inclinato rostro adaptetur recipiens aucto paulatim igne, deinde augeatur donec omnis humiditas abierit. Massa alba à fœcibus separata projiciatur in aquam puram & statim flavescet: abluatur ab acrimonia siccetur & usui servetur.

Antimonium Diaphoreticum.

℞. Antimonij crudi lib. β.

Sal. Nitri lib. I. β.

Mixta exacte & in pulverem subtiliss. redacta per vices & cochleatim in crucibulum candens injiciantur & fiet detonatio: post detineatur materia in igne per horam dimidiam ita tamen ne fluat. Dein eam cum crucibulo injice in aquam calidam pluvialem quæ illicò lactescet, liquorem hunc albicantem effunde & recentem aquam fœcibus reeffunde idque tam diu repetatur donec liquor amplius non lactescat: liquores istos omnes à pulvere subfidente effunde. Pulvis autem insipidus restans lente exsiccetur.

Notent Pharmacopœi quod hic Pulvis semper recens esse debeat, & aëri sæpè expositus iterum qualitatem Vomitivam acquirere.

Crocus Metallorum.

℞. *Antimonij optimi*,
Salis Nitri purissimi an. lib. I.

Reducantur seorsim in pulverem, mox commisceantur: tum injiciatur hujus mixturæ uncia una in Crucibulum candens igne carbonum, cum cochleari vel alio instrumento commodo, & tegatur illicò regulâ, ut sic fiat detonatio, fumum evitando: & cùm universa materia jam deflagraverit, ac stridor cessaverit, injice aliam unciam mixturæ, iterumque hunc laborem repete ignem augendo, donec tota deflagraverit; tum removeatur ab igne, ut quamprimùm refrigescat: tandem fracto vase, materia metallina fusco rubore prædita (quæ proptereà *Hepar Antimonij* appellatur) separetur à crusta albicante.

Regulus Antimonii Martialis.

℞. *Frustror. Chalyb. purioris Unc. IV.*

Candescant optimè in Crucibulo hinc super injiciantur

Antimonij crudi crasse comminuti Unc. VIII.

Quæ simul liquefiant his liquatis adde

Nitri Unc. II.

Sicquæ fluant igni imposita per horam. Deinde effunde materiam in conum fusorium conusque parumper concutiatur ut sic regulus descendat qui jam refrigeratus à scoriis est separandus hic regulus iterum

iterum fundatur tantillum sensim injiciendo Nitri: quo perfecta magis fiat scoria-
rum separatio. Tandemque rursus in co-
num effusus regulus ita remaneat usque
ad perfectam refrigerationem.

Anti-hecticum Poterii.

℞. *Reguli Antimonij Martialis,*
Stanni Anglici an. q. v.

Colliquantur simul & cum triplo
Salis Nitri.

Detonentur & postea aquâ edulcorentur
f. a.

Butyrum Antimonii.

℞. *Antimonij crudi,*

Mercurij sublimati corrosivi an. q. v.

Misceantur exacte in mortario lapideo
& fiat destillatio per retortam Vitream la-
tioris colli in arenâ adauctis successive
ignis gradibus, sic liquor sive Butyrum An-
timonii instar glaciei egreditur qui si con-
crescat in collo vel principio recipientis
ne id obstruat, admove caute carbonem vi-
vum ut lique scat, liquorem egressum re-
ctifica per retortam vitream.

Bezoardicum Minerale.

℞. *Butyri Antimonij, q. v.*

Alteram partem *Olei Glacialis Antimonij,*
prius ponderatam, & injice in Matrarium
fatis

fatis amplum, cui affunde guttatim æquale pondus *optimi Spiritûs Nitri*. Interim cave à noxiis vaporibus. His additis, & dissolutione peractâ. effunde in Alembicum parvum, & igne arenæ destilla usque ad siccitatem. Affunde iterùm relicto pulveri in Alembico jam siccato, eandem *Spiritûs Nitri* quantitatem, tunc *Spiritus Nitri* nihil efficiet; exhalare tamen eum fac destillando, usque ad materiæ siccitatem. Affunde tertio eandem *Spiritûs Nitri* quantitatem, & ut ante destillando evaporare finito. In fundo Cucurbitæ reperies materiam albam, siccam & friabilem, quam in pulverem redactam, diligenter ad usum serva.

Vitrum Antimonii.

℞. *Antimonij in subtiliss. pulver. redacti q. v.*

Calcinetur in patinâ terreâ vitreatâ primò leni igne per horas aliquot dum fumi cessare incipiant spatulâ ligneâ continuò agitando ne in glebas concreseat: dein auge ignem ad incandescentiam vasis donec in pulverem abeat Griseum hunc funde in Crucibulo donec instar Cere fluat postea effunde supra laminam cupream antea leviter calefactam: lente frigescant omnia ne vitrum dissiliat.

Vinum Emeticum.

℞. *Croci Metallorum Unc. I.*

Vini

Vini albi lib. I.

Misce & stent per horas duodecim in infusione calidâ. Deinde usui ferventur.

Tartarus Emeticus.

℞. *CrySTALLORUM Tartari Unc. I.*

Croci Metallorum Unc. ʒ.

Pulverisita coquantur cum aquæ pluvialis s q. ad pelliculæ apparentiam; hinc colata per chartam bibulam duplicatam & Vitro inclusa loco frigidiori ad CrySTALLISANDUM reponc.

Tinctura Antimonii.

℞. *Mineræ Antimonij lib. I.*

Sal Tartari lib. II.

Detineantur in igne vehementissimo per sex vel octo horas, dein refrigeratis omnibus massa pulverisctur huic pulveri superfunde Spiritum vini Tartarificatum ad supereminentiam aliquot digitorum digerantur simul per tres vel quatuor dies donec sanguinis instar rubicunda evadat Tinctura materiam sæpiùs agitando, dein ad usum à fœcibus separata reponatur. Spirit. Vin. Tartarif. sic conficies.

Spiritus Vini Tartarificatus.

℞. *Tartari crudi Unc. VIII.*

Salis Tartari Unc. IV.

Spiritus Vini lib. VIII.

Dige-

Digerantur per diem unum dein destillentur ad mediæ partis abstractionem destillat. Spirit. superfunde

Salis Tartari Unc. II.

Tartari crudi Unc. IV.

Destill. denuò ad mediæ partis abstractionem usui servandum.

Vitriolum album Vomitivum.

℞. Vitrioli albi q. v.

Solve in aquâ pluviam filtra & evapora donec crusta apparere incipiat. Pone in loco frigido Cryсталlos concretos exime. Aquam restantem iterum evapora & tertio dum omne sal purum exceperis. Quod ultimò cum Aqua Rosarum solutum Filtratam & coagulatum calore levi siccetur ad usum.

Oleum Vitrioli.

℞. Vitrioli optimi ad cineritium flavescentem Pulverem exsiccati q. v.

Destilletur s. a. ex retortâ lutatâ servatis ignis gradibus. Oleum destillatum postea rectificetur servato seorsim capite mortuo seu *Colcothar*.

Flores Sulphuris.

℞. Sulphuris purissimi q. v.

Sublimetur ex Cucurbitâ terreâ vitratâ
K super

146 PHARMACOPŒA
superimposito Alembico vitreo vel terreo
vitrato per mediocrem arenæ calorem, flo-
resque colligantur usui fervandi.

Oleum Sulphuris.

℞. *Sulphuris q. v.*

Imponatur crucibulo & accensum de-
stilletur superimpositæ campanæ vitreæ
ut artis est.

Balsamum Sulphuris Vulgare.

℞. *Florum Sulphuris Unc. II.*

Sal Tartari Unc. I.

Misceantur & liquefiant exacte, donec
atro purpureum induant colorem, hisce
postea Pulverisatis adde

Olei Terebinthinæ Unc. IV.

Coq. simul in Phiolâ vitreâ in arenâ re-
posita per tres horas: dein omnibus fri-
gefactis clarum à fæcibus separa & ad usum
îerva.

Balsamum Sulphuris Anisatum.

℞. *Massæ Sulphuris supra scriptæ Unc. II.*

Olei Anisi Unc. III.

Coq. in B. M. per octo horas mate-
riam sæpiùs agitando postea frigefacto va-
se, Oleum supernatans tinctum usui re-
ponatur.

Flores Benzoin.

℞. Benzoin optimi pulveris. q. s.

Ex ollâ terreâ ad formam cucurbitæ facta, cui super impositus est conus Chartaceus, igne leni f. sublimatio: sic post horam dimidiam flores ascendere incipient, qui singula hora semis cum plumaceola colligendi sunt.

De Salibus fixis & Volatilibus.

*Sal Absinthij,
Cardui Benedicti,
Scordij,
Stipitum Fabarum &c.*

Herbæ siccatae exurantur in cineres ex quibus per aquam calentem fiat lixivium quod filtrandum & lento carbonum igne evaporandum in sal, quod ut purius reddatur iterum solvendum filtrandum & coagulandum.

Crytalli Tartari.

℞. Tartari Rhenani pulveris. q. v.

Ebulliat cum multâ aquâ quæ sic imprægnata dum adhuc calet, per chartam bibulam coletur in vas idoneum, deinde si frigori per noctem aut diutiùs exponatur, Crytalli lateribus vasis accrescent quos effusâ aquâ colligito & siccato.

Tartarus Vitriolatus.

R. Liqueoris Tartari q. v.

Instilletur ei successive Oleum Vitrioli rectificatum donec nulla amplius f. effervescentia dein f. evaporatio ad siccitatem.

Sal fixum Tartari.

R. Tartari albi crudi q. v. vel

Massam nigram post distillationem Tartari in retortâ residuam.

Tartarus crudus in furno figulino; massa verò nigra nude inter prunas calcinetur donec alba evaserit, ex hac per aquam calide affusam paretur lixivium quod filtretur in vas vitreum vel terreum, effundatur & exhalet donec omnis humiditas sit absorpta sic in fundo remanebit sal album.

Quod si per dies aliquot vase vitreo pleno exceptum in cellâ aëri exponatur solvetur in liquorem *Oleum Tartari per deliquium* impropriè vocatum.

Sal Prunellæ.

R. Nitri purissimi pulveris. lib. I.

Liquefiat in crucibulo liquefacto per vices insperge

Sulphur. comm. Unc. I.

Quo deflagrato, effunde nitrum fusum

in

in pelvim cupream inundam fiantque lamellæ.

Sal Nitri fixum ejusque Liquor.

℞. Nitri purissimi Unc. III.

In pulverem subtilem redactum indatur crucibulo mundo imponendo carbonibus accensis ut fiat instar aquæ: cum fluxerit injice frustum carbonis igniti & fiet inflammatio, donec injectum illud frustum effervescente cum nitro sit consumptum, tum repete illam carbonum injectionem donec nitrum non amplius inflammetur sed maneat sub massa sicca virescente tum

℞. Nitrum hoc modo fixatum.

Solvatur in aq. ferventis q. s. solutum filtra per chartam. Filtrati f. evaporatio in vitro idoneo ad siccitatem usque & remanebit in fundo sal acerrimum.

Hoc sal in orbe vitreo in cellâ aëri exponatur, tam diu illic relinquendum donec per deliquium fuerit solutum in liquorem limpidum *alcahest glauveri* dictum.

Salis Essentialis conficiendi modus.

℞. Plantæ cujusvis recentis & succulentæ q. v.

Contund. in mortario lapideo deinde affusâ copiosâ aquâ font. clarâ coq. ad mediet. consumpt. decoctum coletur for-

150 PHARMACOPOEA
titer exprimendo. Colat. iterum coquatur
ad Mellis consistent. reponatur in vase
fictili vitreato loco frigido per octiduum,
& Sal Crystallinus concrefcet qui affuso
decocto colligitur, propriâ aquâ abluitur
& ficcatur ad usum.

Spiritus Cornu Cervi.

℞. *Frustulorum Cornu Cervi q. v.*

Indantur retortæ ad medietatem im-
plendæ post amplo recipiente adaptato
fiat destillatio igne aperto gradatim: sic
ascendent Phlegma, Spiritus, Sal Vola-
tile & Oleum fætïdum: Sal Volatile cum
liquore reliquo ab Oléo fætïdo per filtra-
tionem separato. Mixtum in Cucurbitâ
altiore super arenam destillando rectifice-
tur: Sal Volatile Spiritui admisceatur vel
singula separatim asserventur pro lubitu.

Sal Volatile Cornu Cervi.

℞. *Spiritum Cornu Cervi ab Oleo separatum.*
Sal Cornu Cervi primâ destillatione col-
lectum.

Excipiantur phialâ superposito alembi-
co & recipiente vasi huic adaptato: lenis-
simo sed gradatim aucto igne ascendet
Sal Volatile Alembici rostro & lateribus
adhærens quod separatim excipiendum.

Sal Volatile & Oleum Succini.

℞. *Succini contus. q. v.*

Indatur retortæ ut tertia ejus pars repleatur, destilletur gradatim ignem augendo ita simul ascendent Oleum & Sal Volatile, hoc Sal aquâ calidâ eluatur & seorsim super proprium residuum calcinatum rectificetur ut album evadat. Oleum autem per se s. a. rectificetur.

Spiritus Salis Armoniaci.

℞. *Salis Armoniaci lib. I. β.*

Tartari lib. β.

Seorsim pulveris. & commixta indantur Cucurbitæ Vitreæ benè munitæ affundendo aquæ communis *Unc. XXXII.* destillentur leni calore in arena *Unc. XVI.* Spiritus reliquus minùs potens seorsim asservetur.

Flores Salis Armoniaci.

℞. *Salis Armoniaci,*

Marini decrepitati an. q. v.

Pulverisata & mixta indantur Cucurbitæ figulinæ cui in arenâ positæ cæco capitulo adaptato sub initio ignem lenem adhibeto eumque sensim adaugeto quo usque Sal Armoniacum sub farinæ formâ ascendat dein ignem continuato & cum nihil

152 PHARMACOPOEA
ampliùs ascendere animadvertitur, vasa
refrigescere permittito, capitellum remo-
veto & flores pennâ colligito.

Spiritus Nitri.

℞. *Nitri purissimi lib. I.*

Boli communis lib. III.

Exacte mixtis f. s. a. destillatio per re-
tortam.

Spiritus Salis.

℞. *Salis Marini albi lib. II.*

Laterum pulveris. lib. VI.

Exacte mixta indantur retortæ terreæ
ad medietatem adaptato amplo recipiente
primò parcâ manu ignis adhibeatur qui
phlegmate egresso augeatur donec omnes
Spiritus nebularum insiar egressi sint, Spiri-
tus à phlegmate rectificatione separetur.

Spiritus Salis Dulcis.

℞. *Spiritus Salis optime dephlegmati Unc. III.*
Vini rectificati Unc. IX.

Destillentur f. a. per Alembicum Vi-
treum.

Lapis Infernalis.

℞. *Argenti Copellæ tenuiter laminati Unc. I.*
Aquæ fortis Unc. II. ℞.

Dissol-

Diffolvantur igne lento in vase vitreo strenuo, postea coquantur vase aperto igne arenæ sub camino cavendo à fumo ad humiditatis superfluae consumptionem postea effunde in conum fusorium, prius calefactum & refrigeratus Lapis fervetur ad usum.

Ruptorium Commune.

Fit ex lixivio fortissimo secundum artem exsiccatum.

Lapis Medicamentosus Crollii.

℞. Vitrioli viridis lib. I.

albi lib. β.

Aluminis crudi lib. I. β.

Anatron, id est, Fel vitri,

Salis communis an. Unc. III.

Salis Tartari,

Absinthij,

Artemisiæ,

Cichorij,

Perficariæ,

Plantaginis an. Unc. β.

Ponantur in olla vitreata, & affunde parum *Aceti Rosati*, ac coque igne lento sæpius agitando: ubi incipiet crassescere, adde

Cerussæ Venetæ,

Boli Armeni an. Unc. IV.

Misceantur omnia diligenter, donec
vi

vi ignis mediocris in lapidis duritiem *Massa* concreverit, quæ postea fractâ ollâ eximenda, & ad usum probè asservanda.

Si *Gummata Myrrham*, videlicet & *Thus*, volueris addere, instituatur coctio lenta, ne comburantur, & vis illorum in igne evanescat.

Aqua Fortis.

℞. Vitrioli ficcati lib. II.

Salis Nitri lib. I.

Trita simul misceantur, & destilla per retortam Loricatam, igne aperto per gradus.





CLASSIS DECIMA-SEXTA.

De Cognitione & delectu Medicamentorum simplicium.

IN gratiam Tyronum additus est *Tra-*
statulus iste, de cognitione & delectu
Medicamentorum simplicium; non om-
nium quidem, sed precipuorum & magis
necessariorum, ex variis Authoribus col-
lectorum, & ordine alphabetico disposi-
torum prout sequitur.

A*Cacia Arbor* est, ex cujus fernine ma-
 turo, ejusdem nominis succus expri-
 mitur nigricans: ex immaturo rubescens
 seu subfulvus. Et hinc vera veterum *Acacia*,
 quæ *Theriacam* ingreditur, recipiendaque
 est, ubi *Acaciæ* simpliciter mentio fit. Ex
 omnibus præstantissima perhibetur *Lutea*
rubra odoris grati.

Æris Flos, æris scobe tenuissime deli-
 matâ polluitur. Optimus est friabilis, in
 attritu fulvescens, milii effigie, pondero-
 sus, gustu adstringens & modicè splen-
 dens.

Æris Scoria, est recrementum illud spon-
 giarum modo spumofum, quod Fabri tan-
 de ferro quàm ære abjiciunt.

Æris

Æris squamma, est fragmentum, five ramentum quod malleis æri excutitur, quâ de causâ æris rudis squamma cæteris præfertur, ex qua clavi fiunt. Probatur crassa, rufa præsertim æruginosa.

Ærugo, est æris veluti rubigo in æreis vasis, laminis, squammis, scobibus, lapidibus concreta, decem diebus *Aceti acerrimi* vapore post decussa vel derafa.

Æs ustum probatur rubrum, confusu Cinnabarinum colorem imitans; nigrum verò plus quàm decet exustum est.

Agaricus fungus est arboribus adnascens Laryci: estque duplex, & ratione sexus mas & fœmina, & ratione coloris candidus & niger. Probatur *Agaricus* qui candidissimus est & levis, item friabilis, minimè lignosus, rarus, primò statim gustu dulcis, mox amarus, astringens, ac etiam subacer, qualis est qui fœmina nominatur; qui verò nigricans, densus, ponderosus, filis quibusdam veluti nervis intersectus, acerbusque maximè improbatur: quin & qui corrosus, & qui propè caudicem est.

Aloës, alia est *lucida* seu *succotrina*, alia *hepatica*. Præstantissima est *succotrina*, seu *lucida*, quæ est pinguis, glutinosa, transparens ex rubro rufa, *Hepatis* modo coacta, boni odoris *Myrrham* æmulantis, sincera, friabilis digitis, arenarum & calculorum expers, facilè liquefscens, & eximiæ amaritudinis. Hepatica non tam boni odoris est ut *succotrina*, nigrior fractuque contumacior est.

Aloës Lignum eligitur Indicum, colore nigro, cinereis venis discurrentibus, ponderosum, ita ut suâ gravitate in aquam conjectum non innatet, sed subsideat, durum crassum, quodque accensum flammam diu retineat, humidâ pinguedine prægnans. Quò majora sunt fragmenta, eò plus facultatis in se continent.

Ambra optima censetur *Grysea* odoratissima, quæ à sordibus maximè repurgata est, quæque plurimùm ad candorem accedit, quæ videlicet cinerei sit coloris, aut quæ ex venis nunc cinereis nunc candicantibus constat, levis, pinguis, & si ejus fragmentum candenti ferro applicatum, veluti in oleum resolvatur. Pessima est nigra, & vilis, quâ odor chyrothecis conciliatur.

Ammoniacum probatur benè coloratum, *Tigni*, *Calculorum*, ac aliarum sordium expers, *Thuris* similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, odore *Castoreum* utcumque referens, & gustu amarum. *Ferule* succus est, quæ in *Africa* gignitur juxta Ammonis Oraculum.

Amylum, *Amidum*. De multis cerealibus fieri potest, sed optimum, quod ex *Tritico* quinquies aquâ madefacto fit, quod ubi emolliri cœperit, inquit *Dioscorides*, sensim aqua affundenda sine additione, ne quod utilè est unà effluat. Ubi molliissimum fuerit, effusâ aquâ pedibus calcari ac constringi debet; deinde aliâ aquâ superfusâ denuò calcari: tum enatantes ibi
Fur.

Furfures Cribro excipiendi; reliquumque quallo sportisque siccatum è vestigio novis tegulis torreatur in Sole, & fervetur.

Anacardus fructus est cujusdam Arboris, cui Græci nomen indiderunt, à cordis tum similitudine, tum colore. In co liquor residet mellis crassitie, instar sanguinis rubicundus, gustu adurente; in medio nucleus est exiguae Amygdalæ effigie; præferuntur *Anacardia* pleniora, & habiliora, fusca, resina in cortice multa acri nigra, nucleo intus albo. Magna ejus est copia in *Malabar* & reliquis *Indiæ* Provinciis.

Anime, aliud ex *Orientali India*, aliud ex *nova Hispania Indiæ Occidentalis* adfertur. 1. *Anime Orientale* est *Gummi*, quod ex *Orientali India Lusitanorum* navibus in *Europam* adfertur, estque trium generum, primum fulvescit & pellucidum est, planèque nobilius, succinum crudum emulatur. Alterum genus nigricat, & ferè simile est *Taurino* glutini, sive illi resinæ, quam officinæ *Colophoniam* vocant. Tertium genus pallidum est, & resinaceum retorridumque. Omnia verò jucundum in suffumigiis spirant odorem, idemque videntur temperamentum sortita: posteriora tamen duo degustata, magis siccare & amarescere deprehenduntur. 2. *Anime novæ Hispaniæ* est Arboris mediocris magnitudinis *Copalliferæ* vocatæ, *Lacryma*, seu *Resina* per incisionem *Thuris* aut *Masticis* modo collecta, alba ad *Thuris* colorem nonnihil vergens. Defertur gravis *Thuris*,
sed

sed crassioribus, quæ contracta luteum colorem ostendunt instar resinæ: gratissimi ac suavissimi est odoris, & prunis imposita facilè consumitur. Differt ab *Anime Orientali*, quod neque tam candidum neque tam lucidum sit.

Aspalathus, frutex est succulosus, variis horrescens spinis, nascitur in *Istro*, *Nisyro Syria* & *Rhodiorum Insula*. Optimus est gravis & ponderosus, detracto cortice rubescens, aut in purpuram vergens, densus odoratus, gustatu amarus. Est & aliud genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Pro *Aspalatho*, si desit, succedaneum erit semen *Agnicasti*, aut *Lignum Aloës*, aut *Santalum Citrinum*.

Asa dulcis, *Asa dulcis*, officinarum, est *Benzoinum* seu *Cyrenacei Laserpitij Lacryma*. Probatur *Benzoinum*, sincerum & translucens colore rubescens, *Electre* simile, gustu gratum, durum, albis distinctum unguibus, aut glebulis, odore admodum blando, *Xyloës*, odorem referente præditum, fuscum autem & impurum improbatur.

Asa foetida, *Asa foetida*, ex *Media* & *Syria* defertur, foetidi virosique odoris *Sagapenum* redolentis. Melior est quæ vergit ad rubedinem, splendens, *Myrrham* non porrum referens, & quæ facilè dissolvitur in album colorem. Adulteratur æquàm siccetur cum *Serapino* & *Farina Fabarum*, sed dignoscitur facilè adulterata,

ta, sapore, odore & calore.

Auripigmentum, metallica res est aurum colore imitans. Ejus apud *Dioscoridem* duo sunt genera; unum è multis *Squamis*, ut altera alteri imposita videatur, constat: id si purum fuerit, nec ulli materiæ permixtum optimum existimatur. Alterum colore *Sandarachæ*, hoc est rubrum glandis effigie. Deligendum ergò aureo colore micans, è tenuibus *Squamis* compactum, quod facilè funditur, & lapillis aut terræ permixtum non est.

Balsamifera Arbor, seu *Arbor Balsami Indici*. Arborem hanc *Pannucini Chuete* vocant, nostri *Indici Balsami* arborem, *Mexicenses Boitziloxiel*, seu affluentem resinam nuncupare consueverunt, quia liquorem effundit *Syriaco Balsamo* simillimum, neque odore aut viribus inferiorem. Arbor est *Mali Medicæ* magnitudine, foliis *Amygdali* majoribus, tamen rotundioribus, & magis acuminatis. Floribus in extremis ramorum flagellis luteis, initio loculorum oblongorum forma, sed procedente tempore quorundam veluti foliorum, cæteris longiorum & latiorum, in quorum extremitatis cavitate, semina, inclusa continentur, candicantia, & in quemdam pallorem inclinantia, oblonga, & paulisper contorta, seminibus *Mali Medicæ* similia. Inciso ergò quovis anni tempore hujus arboris cortice stipiteve, sed præcipue exactis jam atque desinentibus imbribus, *Liquor* ille nobilis toto orbe celebr

leber, necdum satis laudatus stillat, quem *Balsamum* appellant è fulvo in nigrum inclinans colorem, sapore acri, paulisper amaro, odore vehementi, sed tamen gratissimo.

Bdellium, densata lacryma est ex arbore *Saracenica* quadam *Ceraso* simili cortice vestita emanans, atque circa ramulos in magnos grumos concreescens, qui tam integri quàm confracti ex *Arabia*, *India*, & vicinis aliquot locis adferuntur, unà cum adhærente sæpè cortice & ramulis. Hoc *Myrrhæ* concretionem & adspectu simile: quare censuit quidam *Bdellium Myrrhæ* speciem esse (quidam *Anime* esse voluit) à qua differt non solum quod arbores sint differentes, sed & in eo quod *Myrrha* sit fragilior, & in igne, ut resina, ardeat: at *Bdellium* magis naturam *Gummatis* respicit, difficile enim ardet, & humore mollescit, odor non sine gravitate suavis. Probatur gustu amarum, translucentum, intus pingue, liquefcens facillè, & si digitis subigitur, mollescens, ligni ac sordis expers, suffitu odoratum, & albis maculis, ungui humano simillimis refertum, improbatur nigrum sordidum uberioribus glebulis in offas convolutum: adulteratur *Gummi* & *Cerâ*; sed fraus gustu & odore innotescit, quia non ita amarum nec odorum est.

Bezoar Lapis Orientalis, ex quo Animalis proveniat diversi Authores diversa scripsere, & præcipua pars tenet quod sit Animal *Persiæ* ac *Indiæ Orientalis* partim

Cervo simile, partim *Caprae* hinc fit ut aliis *Capra* audiat, aliis *Hircus*, aliis *Capri-Cerva*: v. g. dicitur *Capra Indica*, *Amato*; *Capra montana Menardo*, *Capra silvestris Lacune*; *Pazon Persis*.

Bezoar Lapis Orientalis, qui est *Lapis* in dicto Animali repertus (ac potissimum in proventriculo, hinc & in ventriculo, aliisque cavitatibus internis) figurâ scilicet variante, ovali, rotundâ, sessili & intus cava (meditullio paleam pilos vel simile continente) superficie levi & splendente: substantiâ è laminis instar Cæparum sese incumbentibus compactâ: variante item colore (plerumque atrovirente, hinc dilutius virente pallescente, cineritio, fulvescente, melleo, &c.) odore nullo; variante magnitudine & pondere (plerisque scilicet infra *Juglandis* magnitudinem constitutis, nonnumquam & paulò majoribus.

Nota. Dantur & adulterati, seu falsi confecti, scilicet ex *Lapidum* fragmentis & pice artificiosè coaugmentatis. Item ex creta, cineribus *Testarum*, *Sanguine sicco*, & *Lapidibus Bezoar* minoribus pulverifatis, & cum *Liquore* incorporatis: item ex *Cinabari*, *Antimonio*, *Mercurio* ignis artificio compactis, tinctis, &c. qui sanè non modò citra utilitatem, sed & cum detrimento in usum accersuntur.

Notæ ergò bonitatis ab Authoribus passim notatæ sunt.

1. Forma à forma renum aut ovi colum-

lumbini exterius levigati diversa, utpote quæ signum Lapidis adulterati.

2. Structura Laminis multis instar Cæparum sese invicem incumbentibus, iisque singulis glabris, levibus, splendore coruscantibus, quod tamen alii reprobant.

3. Cavitas (Meditullium) expers rei heterogeneæ præter pulverem, quidam malunt inclusam Paleam, Festucam, Graminum & similia.

4. Pondus aliis leviùs, nonnullis graviùs.

5. Commistio cum Calce, verbi gratiâ, si Lapis humectatus & Calci vel muro affrictus, Calcem colore viridi tingat: si Lapis Calce vivâ (cui admistâ aquâ) inunctus paulò post flavescat: si Lapis chartæ creta oblitæ affrictus viridem inducat lineam: si pulvis cum Calce vivâ mixtus colorem ex pallido virentem referat (quod tamen non de omnibus verum esse potest).

6. Friabilitas & dissolutio in aqua, quæ tamen itidem & falsi Lapidis propria esse non nequit.

7. Liquatio, verbi gratiâ, si acus candens intrudi possit.

8. Disparitas fragmentorum cum gypso aut terra cocta (in duritie scilicet.)

9. Experimentum.

Verùm enim verò, summa in dijudicatione Lapidis cautio adhibenda est, neque absque notarum syndrome de bonitate aliquid certi statuere expedit, præstantissimus

164 PHARMACOPŒA
inter cæteros habetur *Perficus*.

Bezoar Lapis, provenit ex Animali *Pearuano*, *Capri-Cervo Orientali* simili, cornibus tamen orbo, depascente herbas salutiferas. *Lapis Bezoar Occidentalis*, qui est *Lapis* locis iisdem Animalis, ut de priori dictum, circa rem heterogeniam in cavitate mediâ contentam tunicatim concretus, *Orientalibus* ut plurimum major, superficie scabra, colore cinericeo albo, nigro, obscurevè virente, qui optimus. Præstantiores habentur (uti & *Orientalis*) ex Animalibus montanis exempti.

Bitumen Judaicum cæteris anteponitur. Eligitur fusco colore, splendidum, ponderosum ac validum odorem vibrans, dum aquis innatat molle; cùm siccatum est, Pice siccâ duriùs efficitur. Nigrum autem, & sordidum vitiosum est. Adulteratur Pice, quod color niger indicat & Picis odor.

Camphora, *Capur*, & *Casur Arabibus* dicta in Burneo optima est, est autem arbor (quam Garcias & Clusius se vidisse scribunt) magna instar *Salicis*, è cuius *Meditallio* hæc Lacryma extrahitur, quæ per se coagulatur. Lignum hujus arboris est album & leve. Melior *Camphora* est candida, perlucens, pura, friabilis, tenuis & valdè odorata: Crassa verò, fusca, nigra, assulis ligni sui implicata improbatur: pani calido imposita si madescat, sincera est; si areseat spuria. Si interdum rubentibus, aut nigricantibus maculis conspersa videatur,

tur, id ex sordidarum manuum contrectatione, aut ex madore fieri dicunt; sed facilè id emendatur, si in panno lineo colligatur, in calidam aquam dimittatur, addito *Sapone* & *Limonum* succo; deinde probè elota in umbra ficcetur: sic candida redditur. Affervatur femine *Lini*, aut *Mili*, aut *Psyl*, aut *Pipere* sepulta, ne aëri exposita evanescat.

Carneolus Lapis, *Sardius*, vel *Sardinus* *Plinio* dicitur, similitudine à *Sardis Sale* conditis desumptâ, quod eorum colorem repræsentet, vel quod loturæ carnis similis sit: quâ ratione *Gemmarii* illum *Carneolum*, vel *Corneolum* appellant. Laudatissimus circa *Sardiniam* reperitur, & qui purissimâ juxta, & nitidissimâ consistit substantiâ, colore carneo & translucido.

Cassia solutiva. Arbor (unde colligitur) est procera instar *Juglandis*, folia habens ei valdè similia. Ligni materies valdè compacta. Fructus *Siliquæ* sunt longæ, rotundæ, nigræ, intus medullâ multâ, nigrâ & multis seminibus rotundis, & planis, quæ à se invicem membranis ligneis ac transversis dividuntur prægnantes. Eligenda est quæ ex *Memphi* & *Alexandria* *Ægypti* convehitur, non admodum crassa, pel-lucens, recens, gravis, fracta, & quæ concussa seminibus minimè constrepat. Utendi tantum tempore extrahenda: nam extra Cannas promptè corrumpitur, & in vasis servata pejor evadit. Advehi cepit & ex *Brasilia* *Crassia pargatrix*, cujus uncia

una plus purgat, quàm uncia duæ *Cassia* illius *Ægyptiacæ*.

Cassia Græcorum, ut ex Dioscoride & Galeno colligere licet, *Cinnamomum* sive *Canella* officinarum videtur, quam pro *Cassia aromatica* uti possimus. Præfertur rufescens, longa, gustu cum acrimonia grato, odore optimo & suavissimo.

Castoreum Medici vocant *Fibri* seu *Castoris testes*. Est autem *Fiber*, seu *Castor* Animal amphibium, ex albo cinereum in dorso nigricans, quod partim in aqua, partim in terra victitat, & ex utroque pabulum venatur, *Lutrarum* modo, quibus valdè simile est caudâ exceptâ, quæ *Castori* glabra est, & lata, & Piscium modo squammosa, *Lutris* longa, rotunda, hispida rufa, & ad castaneam accedens, ut & totum corpus. *Castoris Testes* eligi debent, qui ex uno ortu connexi sunt, liquore intus veluti cereo, odore gravi, & virus redolente, gustu acri, ac mordente, friabiles, naturalibus tunicis circumdati. Diligenter animadvertendum est ne ab impostoribus factitii *Castoris Testes* emanent: pauci namque habentur, qui adulterio careant, cujus manifestum est indicium nimia eorum magnitudo, cum legitimi parvi admodum sint.

Chalcitis metallica res est, in venis *Ærariis* nata, præfertur *Æri* similis, friabilis, nec lapidosa, nec inveterata incurstantibus oblongis venis splendentibusque, promptissime liquefscens: usta melior est quàm

quàm non uſta , & quæ urendo cineritia evaſerit , modus urendi in *Dioſcoride* eſt l. 5. cap. 75.

China , *Chinea radix* , *China radix* , alia eſt *Orientalis*. Ex Regione *Sinarum* *China* dicta. *Occidentalis* ex *Hiſpania nova* & *Peru*. Præfertur *Orientalis* , quæ exterius eſt colore rubente aut ſubnigro , interiùs candicante aut ſubrubente : & hæc quò nigrior , eò melior. *Occidentalis* colore eſt interiùs magis ruſo. Optima eſt recens pondere præſtans , ſolida ſucculenta , non cariola aut ſapore inſipida.

Corallium , ab effigie , & natali loco ſæpè nec improprie *Lithodendron* , quaſi *Lapid-arbor* , & aliquando *Frutex marinus* dicitur : nam ut ait Macer , hoc velut arbuſti ramuſculus eſſe videtur in Tyrrheno ſiquidem , & Siculo mari provenit & *fruticis* inſtar aſſurgit , ac ramos emittit. Hinc à nonnullis inter *Frutices* , ab aliis inter *Lapides* , à quibuſdam inter *Bitumina* reponitur. Verè tamen nihil iſtorum eſt. Sed inter omnia ambigit. Triplici autem agnoſcitur diſcrimine , ſi quidem rubrum , aliud album , & tertium nigrum , priùs ut aſpectu jucundius , ſic melius , medicatius , & ad armillas aliaque ornamenta aptius. Album ut ſpongioſius , ſic levius magiſque refrigerans. Nigrum rariùs viſitur , minusque medicatum & expetitur. Laudatiſſimum rubeum , quod ſemper uſurpatur , cum abſolutè *Corallium* ponitur. Aliud inſuper datur mixtum , intermixtis nempe

coloribus intercurfantibus, estque minùs bonum. Rubeum ut cæteris præstet, debet esse colore floridum, ut *Alga* odoratum, ut *Frutex* ramosum, fractu facillimum, non scabrosum, lapideum, nec rursùs inane aut concavum. Idem de albo intelligendum.

Costus præcellit solidus, optimè plenus, cortice cinereo sive pallecente, intùs candicans, interdùm colore buxi, odore admodùm fragrans, irinum videlicet, sive violaceum spirans odorem, à teredinibus non crosus, gustu acuto, ac linguam vellicante. Omnes ferè optimi *Costi* notæ in *Angelicæ radice* reperiuntur. Hinc ut nonnulli putent, eam pro vero *Costo* substitui posse.

Curcumæ radix laudatur recens, intùs *Crocea*, foris *Zinziberi* persimilis; vehementi amaritudine & acrimoniâ dum recens est caret, ob multam humiditatem: ficcata verò acris est, sed non adeò ut *Zinziber*.

Cyperus nascitur in *Italia*, in palustribus, & humecto solo, quin & jam locis cultis. In *Germania* in hortis quibusdam colitur, optimus defertur ad nos ex *Syria* & *Alexanaria Aegypti*, in cujus defectu *Italicum* supponunt officinæ. Reperitur verò in officinis *Cyperus* duplex, radice rotundâ & longâ; 1. *Cyperus* rotundus fortè à radicis effigie quæ pixidulam, aut poculum vasculumve pusillum imitatur dictus videtur; hic præfertur ad usum Medicum, qui si
desit

defit longus *Cyperus* substituitur. *Dioscoridi* est optima radix gravissima, densa, fractu contumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia jucundi. 2. *Cyperus longus*. Volunt quidam quod hic *Cyperus* longis radicibus discriminis gratiâ vocetur *Cyperis*. Qui verò rotundis est radicibus, *Cyperus*.

Dictamnium legitimum ac probatissimum in *Creta* Insula tantum gignitur. Alia verò planta *Dictamnium album*, vocata *Fraxinella*, planè à *Dictamno Cretensi* diversa, quæ quamvis valdè efficax sit, *Dictamno Cretensi* substitui tamen non potest.

Elaterium, est succus *Cucumeris Asinini* condensatus; optimum censetur leve, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodque lucernarum luminibus objectum facilè flagret, porraceum autem scabrumque sit turbidum spectetur, atque erui cinerisque plenum sit ac grave, vitiosum statuitur. A *Theophrasto* statuitur *Elaterium* Medicamentorum omnium diuturnissimum, optimumque quod vetustissimum.

Elemni, resina est *Cedri* aut *Oleæ Æthiopicae*, eligatur ex *Citrino* pallescens, per quam odora, pura, & à pulverum admixtione immunis. Adulteratur resinâ; sed fraus odore sit manifesta.

Euphorbium succus est acerrimus, ex Arbore *Lybica* ferulæ speciem habente emanans. Eligendum est translucens & acre, adulteratur *Sarcocollæ* & *Glutinis mistiq-*

mitione. Sed difficile quidem experimentum, quippè cum levi gustu os accensum diù detineat, adeò ut quidquid ori objiciatur, planè *Euphorbium* resipiat.

Galanga veteribus *Gracis* ignota, & *Arabibus* non satis perspecta, habetur duplex: major & minor; 1. *Galanga* minor *Cyperus Babylonica* ex *Chinarum* Regione in *Indiam*, & inde in *Lusitaniam* desertur, unde *Chinensis Galanga* dici potest. Optima est quæ fuerit gravis, saturatè rufa, odorata & gustu acerrima. 2. *Galanga* major, tametsi longè crassior radix sit, ignavior tamen est, & viribus infirmior, colore etiam dilutior, minusque odorata, foris subruffa, intùs *Zinziberis* palliditate prædita, gustu acerrima sine aromatica aliqua gratia; hâc in nulla confectione utendum est.

Galbanum est succus nascentis in *Syria Ferule*, seu *Liquor Græmis* flavis aut candidantibus compactus, substantiâ molli, pingui digitis adhærente, sapore amariusculo, odore gravi. Eligendum purum, pingue cùm accenditur flammam nutriens, mediocriter viscosum, colore flavum tale cùm recens est *Dioscoridi* maximè laudatur *Cartilaginofum* (vel ut alii vertunt granulis refertum) *Thuris* effigiem præbens, pingue minimè lignosum, retinens nonnihil adjecti seminis, & *Ferule*, gravi odore, neque valdè humidum, neque nimis aridum.

Granatus est gemma pellucida, ex flavedine

vedine rubens, ignis instar, *Minique nativi*, vel factitii colorem ferè referens. Sunt *Granati* alii *Orientales*, alii *Occidentales*, *Orientales* uti meliores, ita & pretiosiores; proindè Provinciam officinalem solis *Occidentalibus* relinquunt.

Hæmatites Lapis, *Lapis sanguinarius* (quod fractus sanguinem imitetur, vel quod sanguinem sistat) foditur non modò in *Ægypto*, sed & in pluribus *Germaniæ* & *Bohemiæ* montibus, præsertim in *Hercynia* sylva, & in ferri fodinis quibusdam. Commendatur friabilis, saturo colore niger, durus, & suopte ingenio æqualis, nullâ sorde admistâ, nulloque Zonarum discursu.

Hermodaëtylus, radix est officinis nota, probatur candidus, corpulentus, plenus, gravis; non cariosus, qui leni contusione in pulverem *Farinæ triticeæ* similem faciliè redigitur, sapore suavi & dulci.

Hyacinthus est gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignisque flammam imitans. Sunt alii *Orientales*, alii *Europæi*. Hi inveniuntur ad *Iseram fluvium* in confinibus *Silesiæ* & *Bohemiæ*, suntque *Orientalibus* ignobiliore. Quoad colorem, referunt alii colorem *Minij nativi*, aut sanguinis admodum biliosi; & hi sunt præstantissimi: alii rubedine *Croci* flavescent; alii exactè ostendunt succini colorem, & hi viliores, alii albi pellucidi succini colorem referunt, & hi omnium vilissimi habentur.

Hypocistis copiosè ad *Cisti maris* Radices nasci-

nascitur, quæ summis cespitibus diffunduntur, & cohærent novo nempè vecum cillus jam ad explicandos flores se parat; nam quando primùm emergit, purpureo apparet colore, deinde paulatim assurgens & sese explicans, multum pristini coloris remittit, & cytinis suos profert candicantes turgidos, & lento succo plenos, qui etiam *Hypocistis* appellatur. Nascitur in pluribus *Etruriæ* asperis locis, montibus potissimum, *Lucensibus*, *Apenino* quoque monte, itemque in *Hispania*, *Lusitania*, & *Gallia Narbonensi*.

Jalappa incognita fuit veteribus. Veram autem historiam *Jalappæ* exponit Gregorius Horstius libro tertio Epistolarum Medicin. est autem nihil aliud docente Clofsæo, quàm mirabilis *Peruviana*, cujus radix inodora in diebus Canicularibus effoditur, tesseratim inciditur, inque loco umbroso ficcatur.

Kinkinna, *Kinakina*. Arbor ex nova, quæ *Orientem* spectat, *Peruvia*, vocatur ab incolis *Gannanaperide*, ab *Hispanis* *Palo de calenturas*, id est *Lignum Februm*: ejus cortex inter orbis *Americani* divitias notissimus ad nos devehitur crassitie mediocris, substantiâ tenuis, foris scaber, passimque exili canescens musco, intus lævis, colore ferrugineus, qualis est *Cinnamomi*, amarus, & terræ quâdam admixtâ portione austerus. Adfertur ex *Peruviano* Regno, cortex dictus *China Febris*.

Lacca

Lacca, Gummi quoddam est, quod ex *India* mauritani petunt, eoque etiam in suis compositionibus utuntur, ut in *Dialacca*. Melior est quæ sincera est, lignique fragmentorum expers, & quamvis prædura exsuccaque sit, præmansa tamen spiritum efficit sanguineum, quod probitatis est indicium.

Ladanum, Liquor est ex *Cisti*, *Ledon* appellati, foliis exsudans. Optimum, minimeque adulteratum, odoratum esse debet, subviride, facile mollescens, pingue, resinofum, arenularum aliarumque fordidum expers, quale in *Cypro* gignitur.

Lapis Armenius, est similis *Lapidi Lazuli*. Præfertur, qui est maximè viridis, communicato colore cum cæruleo, lævis, perquam æquabilis, tactuque friabilis. Ejus loco *Lapis Lazuli* usurpari poterit.

Lapis Judaicus. In *Judæa* nascitur *Glaucis* effigie, candidus, scitâ admodum configuratione, lineis æqualiter inter se distantibus, quasi industriâ detornatis. Passim in officinis habetur.

Lapis Lazuli, apud *Arabes* is est, quem *Cyaneum Græci* nominant, effoditur in *Orientalibus* auri fodinis. Præstat, qui similis est sereno cælo, maculas quasdam aureas, stellarum modo radiantes habens, & aliorum Lapillorum mixturæ expers. Duplex habetur: *Orientalis*, & qui ex *Germania* adfertur; *Orientalis* ex eo cognoscitur, quod in igne colorem non amittat, sed illustrior reddatur; *Germanicus* verò hebe-

174 P H A R M A C O P O E A
hebetatur, & de colore remittit.

Lapis Nephriticus, in Nephritico dolore maximè laudatus, ex *nova Hispania* defertur. Variegatus est & *Præssio* similis, ad viridem colorem lacteo permixtum tendit; præfertur viridior.

Lapis Pyrites, vulgò *Marchasita*, gignitur autem *Marchasita* (ut rei metallicæ periti tradunt) ex impuro Metallorum halitu: quo fit ut ferè semper reperiatur in montium cacuminibus, præfertur qui ærei coloris est.

Lignum Guajacum, *Higioxylon*, *Lignum sanctum*, *Lignum Indicum*, est primum celebratissimorum illorum simplicium, quæ ex *Occidentali India* deferuntur. Sunt verò *Guajaci* genera tria, primum defertur ex *Insula sancti Dominici*, secundum ex *Insula S. Joannis de Portu divite*, quod postea repertum superiori ferè simile, sed per omnia minùs, & penè sine matrice, superiore tamen odoratius & amarius, quod illi præponitur, & ob mirandas facultates *Lignum sanctum* dicitur. Multæ sunt *Insulæ* in Oceano, in quibus *Guajacum* nascitur, ut *S. Benedicti*, *Hispaniola*, *S. Crucis*, *S. Dominici*, *S. Joannis de Portu*: ægregium tamen in *Insula S. Joannis* oriri existimatur: sed cum hoc Ligno naves onustæ, in *Hispaniam*, *Genuam*, *Venetias* afferantur, nec ratione loci dignosci possit, ex ipsius dotibus eligendum, quod ponderosum est, corticem adhærentem habet, gravem odorem obtinet, & aquam, in qua

CO-

coquitur, facilè tingit. Tertium genus in *Orientalibus* reperitur. *Lignum Guajacum*, nonnulli ad *Buxi* speciem, alii ad *Ebeni Dioscoridis* alteram speciem non quidem malè retulerunt, alii novum arboris genus esse censuerunt: grave est hoc Lignum ut in aquis statim subsideat, non fluitet. Cortex ejus æquè atque Lignum in usum venit, quem nonnumquàm *Fraxini Cortice* adulterari contingit, aut similibus, qui tamen dignoscuntur sapore, & odore quodam peculiari.

Lignum Nephriticum, ex nova *Hispania* mittitur, quod cinereum est, crassum, enode. & exiguo spatio aquæ injectum, eam cæruleo colore tingit, qui sensim intenditur pro temporis diuturnitate, cæruleum idè dictum, quoniam adulteratur alio ligno simili, quod aquam crocco colore inficit, ne quis fallatur.

Malobatrum, est folium *Indicum*, *Nardo* *Indico* odore & sapore simillimum, sed *Nardo* efficacius. Laudatur recens ex candido nigricans, fractu contumax, integrum, & odore vegcto nares feriens. Est autem *Malobratum* folium sui generis, quod *Indicæ* gignunt palludes, *Lentis palustris* modo innatans aquis sine radice, id ipsum collectum statim lino trajicitur, siccatumque reconditur. In ejus locum *Mauri* invexerunt folium *Lauro* proximum, sed majus, & nervis tribus folium intercurrentibus distinctum odore jucundo. Ejus succedaneum est *Spica* tam *Indica* quam
Ceb-

Celtica, vel *Cassia lignea* vera, aut potius cortex externus *Citri* siccatus.

Manna, est veluti ros cælestis dulcis & gratus, qui ex aëre sudoris instar exudans, sub lucanis horis super frondes & ramos arborum, herbarumque delabitur, & brevi *Gummi* modo concrefcit. Præfertur *Calabrina*, & in primis quæ stirpium frondibus insidens colligitur, proindè *Foliorum Manna* cognominata, minutis granulis similis, candida, gustu dulcis, recens atque suavis. Secundas partes sibi adsciscit quæ ramis insidet; tertias verdè quæ lapidibus & solo inhæret, nimirum hæc granulis constat crassioribus, & colore longè minus sincero.

Manna Thuris, sunt minutissimæ *Thuris* micæ. Laudatur alba, pura, micarumque frequentia prædita. Sunt qui cribratâ *Pini* resinâ ac polline, aut cortice *Thuris* contusi adulterant, sed hæc igne deprehenditur: nam adulterata non æqualiter incensa flagrat, sed fuliginosum & impurum vaporem expuit, variumque odorem habet.

Margaritæ, ex Conchis quibusdam, seu Piscibus testaceis; *Ostreorum* valdè similibus in *Indico mari* victitantibus sumuntur, quæ si parvæ fuerint, *Margaritarum* nomen servant; si crassæ & ponderosæ, *Uniones* appellantur. Præferuntur *Orientalis* candidissimæ, lucidissimæque: Perficæ & perforatæ improbantur.

Marum, herba est non dissimilis *Majore*
rana

rana, cujus loco accipitur *Dictamnus Creticus*, vel *Majorana*.

Mastiche, refina *Lentiscina*, *Mastix*. Est refina quæ *Lentisci* trunco vulnerato, primum liquida distillat, dein paulatim in guttas densatur, foris candida aut flavescens propter inhærentem pulverem, quo absterfo, propemodum crystallina & translucens. *Lentiscus Mastiche* eructans, est arbor admodum procera; non tantum in *Chio* & *Agypto*, sed & in certis locis *Italiae*, ut in *Apulia* reperitur. Ex ejus ligno *Dentiscalpia* fiunt optima, quibus non modo repurgantur dentes, sed roborantur, gingivæ constringuntur, & ori suavitas conciliatur. Præfertur resplendescens, & candore *Hetruriæ Cerae* similis, retorrída, crassa, odorata, friabilis, stridorem edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur *Thuris*, resinæque *Pineæ nucis* mixtione.

Mechoacan, *Mechoaca*, *Mechoacana*, *Peruviana Mechoaca*, *Bryonia Mechoacana* (quod radix *Bryoniæ* sit similis, à qua tamen multum differt, quod *Bryoniæ* radix viridis & sicca, admodum acris, *Mechoacan* verò insipida & sine acrimonia) *Mechoacan* radix diligenda est recens, intus albicans, exteriori parte nonnihil cineritia, crassa, compacta, multis circulis distincta, nullius mali saporis particeps, & sine acrimonia. Improbatur valde candida, nigra, & cariosa. Quæ in *Quito*, & circa *Nacuragua* nata, præstantior est priore.

Mentha folia tenuia sunt angusta, Capillacea; furculi graciles Cubitales, in quorum summitatibus prodeunt umbellæ cum flosculis candidis; radices admodum tenuis sunt & odoratæ, quarum in officinis usus est.

Moschus. Est autem *Moschus*, & excrementi, & Animalis, à quo idipsum habetur nomen. Animal verò exoticum est, idque *Indicum* in Regno *Pegu*, ac potissimum in *Agro Tumbascorum* admodum frequens, *Capræ* non multum dissimile, ac corpore prægrandi *Dorcadem Moschi*, *Gazellam Indicam* & *Capreolum Moschi* nominant.

Huic cum *Veneris* æstro percellitur, furoris vehementia *Umbilici Regio* intumescit, ibique congesto sanguine multo & crasso, fit apostema: atque tum ferum illud Animal potum cibumque averfatur omnem, & humi sese provolvens, atque lapidibus & arborum truncis turgentem partem quâdam voluptate confricans, dirumpit ac vomitum aperit, ex qua sanies quædam excernitur, quæ verus est *Moschus* omnium rerum odoratissimus & suavissimus, quique alias omnes *Moschi* varietates, quæ nunc multæ circumferuntur, bonitate superat.

Illa autem sanies, super arborum truncis aut saxi relicta, calore Solis, ac cæli bonitate coquitur, elaboratur, & virosus ipsius odor, si quis sit, dissipatur, fitque præstantissimus ille *Moschus*, quo Reges &

& Magnates donantur & utuntur; quod verò passim venditur, bonitate longè inferior est, & ab Animalibus venatu captis carpitur. Captâ enim Ferâ, Venatores partem cum corio simul abscindunt, cruorem effluentem exprimunt, colligunt, exsiccant, & servant cum utriculis aut pelibus eorundem Animalium, quorum sæpè sanguis exsiccatus, pauculæ recrementi, dicti portioni commixtus, pro puro *Moscho* ab institoribus seu adulteratoribus venditur. Qui verò suapte naturâ in Animalis utriculo sibi maturitatem comparavit, hic verus & optimus est *Muscus*.

Est quoddam genus *Mustellæ* majoris, quæ quod Martia sit & pugnax (Gallinas enim etiam grandiores enecat) quibusdam *Martes*, aliis *Marturella*, vulgò *Fovina* dicitur, cujus excrementa *Moschum* redolent.

Sunt & quædam plantæ & fructus, qui hujus aromatis suavitatem naribus & palato referunt, ut *Geranium Moschatum*, herba *Moschata* dictum, *Rosæ Moschatæ*, & *Pyra Moschatellina*.

Myrobalani quinque generibus distinguuntur, videlicet in *Citrinas*, *Chebulas*, *Emblicas*, *Indas*, & *Bellericas*. *Citrinæ* laudantur multum flavæ, in viride inclinantes, densæ, graves, gummosæ, cortice crasso osparvum complectente. *Chebulae* quò majores, cò meliores, nigræ in rubrum inclinantes graves, quæ aquæ impositæ statim merguntur, cortice crasso. *Indæ* optimæ sunt

nigræ, substantiâ solidâ, si frangantur densæ, magnæ, graves sine ossibus. *Emblicæ* sunt magnæ, graves, densæ, carne multâ, ossibus exiguis. *Bellericæ* verò, densæ, magnæ, graves & cortice crasso, quæ his notis carent, aut vetustate exolectæ, aut aliud incommodum passæ sunt.

Myrrha, *Arabica* arboris lachryma est. Laudatur quæ subviridis est, pinguis, splendens, resinosa, mordens, foris undique concolor; si frangatur, venas quasdam unguium modo candidas intus habens: talisque eligenda quæ recens sit, fragilis, lævis, amara insuper & odorata. Inutilis est nigra, aut piceo colore, gravis, retorrida & pinguedine carens.

Nardus, officinæ *Nardi spicam* appellant, cujus duo sunt genera: unum *Indicum*, alterum *Celticum*. *Indicum* perquam odoratum sit, recens & læve; haudquaquam pulverulentum, *Cyperum* redolens, brevi spicâ, amaro sapore linguam siccante, quod diu in sua odoris gratia permaneat. *Celticum* verò in *Ligurie* alpebus nascitur: laudatur maximè recens, jucundi odoris, radice numerosâ cohærens, plenum & non fragile. *Nardum rusticam Lavendulam* vocamus.

Opium succus est è capitibus papaveris nigri. Trium est generum: unum ex capitibus & foliis expressum, *Græcis Meconium* vocatur, quod ignavius: alterum lachryma est ex capitibus paululum incisus extillans, quæ verum est *Opium*. Optimum est densum,

densum, grave, ainarum, odoratu soporiferum, quod facilè *Aceto* dissolvitur, lene candidum, neque asperum neque grumosum, quod colatum non statim uti cera coëat, quod in Sole diffundatur, & admotum lucernis clarâ non atrâ luceat flammâ, & extinctum odoris viam conservet. Adulteratur *Glancio*, hoc est *Mentha* aut Gummi, aut silvestris *Lactucæ* succo. Verùm *Glancio* fucatum in dilutione, *Croci* colorem reddit; *Lactuca* depravatum inodorum est, & asperius: Gummi vitiatum, infirmum est & splendescit.

Opoponax, succus est effluens ex incisa radice, aut caule *Panacis*, quod *Dioscoridi* *Heracleum* dicitur. Commendatur quamamarissimus, interne albus aut subfulvus, foris colore croceo, lenis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent & gravi odore. Niger improbatur ac mollis, nec non Ammoniaco aut cerâ adulteratus; sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resolvatur, & lactescet.

Rhabarbarum, in interiore *Sinarum* Regione provenit; undè in urbem *Cantan* (nobilissimum totius Provinciæ Emporium) exportatur, & inde navibus in *Indiam* advehitur. Optimum est si odore nares feriat, compactam simul habeat substantiam, aureo sit colore, aureisque ac ruffis venulis abundè distinctum, gustu amarum, grave pro lævitate sua, & quod madefactum croceo colore manum fricantis tingat. Conservatur per annos tres aut

quatuor integrum incorruptumque, si cerâ solâ, vel cerâ cum *Terebinthina liquata* circumlinatur, aut *Melle albo*, aut *Psyllio*, aut *Milio* mergatur.

Rhaponticum, ex *Septentrionali* plaga advehitur, optimum habetur quod teredines non habet, gustuque subacri cum remissa astrictione lentescit: ejus radix nigra est, *Costo nigro* foris, *Centaurio magno* intus similis, sed minor, & magis rufa, fungosa & laxa, aliquantulum lenis, sine odore, quæ mansa colorem reddit pallidum ad *Crocum* inclinantem, fragilis & amara.

Rubinarum multa sunt genera, sed nobilior ille *Rubinus* vocatur, cujus nitor vivacior sit cæteris, & rubore sit splendens & elegans: à rubore non sine ratione appellatus est *Rubinus*, optimus in Flumine *Pegu* reperitur, durus & frigidissimus.

Sagapenum, quod officinis *Serapinum* dicitur, est succus *Ferulaceæ* herbæ in *Media* nascentis. Laudatur translucens, tulvo forinsecus colore, intus albedo, & quid inter *Lasër* & *Galbanum* redolens, gustu acri, substantiâ crassâ, & facilè in aqua resolubile, quod his caret notis, adulteratum & spurium censetur.

Sandaracha, Lapis est in Metallicis venis, plerumque cum auripigmento nascentis: idèd *Serapioni* auripigmentum rubrum dicitur: rufa est nonnihil ad luteum vergens, quæque cum uritur fumum emit tit pallidum, sulphurisque virus redolet

etsi non consumatur. Animadvertendum est, quod *Sandaracha* non sit vernix scriptoria, ut aliqui putant; si quidem nihil aliud hæc est, quàm *Gummi Juniperi*, quod à *Mauritanis Sandarax* dicitur.

Santalum, est triplex, pallidum, album & rubrum, quæ genera non nascuntur in una Provincia, sed magna est locorum distantia. Pallidum, quod & Actuarius dicitur *Santalum Citrinum*, *Santalum luteum*, *aromaticum*, *odoriferum* aliis præfertur; quia odoratius. Num verò id habeamus, valdè dubitandum, quandoquidem scribit Garcias ab horto vix in *Lusitaniam* deferri, quoniam ejus pretium majus sit apud ipsos *Indos*, quàm apud *Lusitanos*. Fieri igitur poterit, ut aliquod aliud odoratum lignum, ut *Cedri*, vel alterius arboris, nobis pro legitimo *Santalo*, obtrudatur, cùm & vulgare *Santalum Citrinum* acre sit, quale legitimum non est. In ejus defectu substituendum est, album seu candidum *Santalum*. Rubrum *Santalum* postremum locum obtinet, quod nullo commendetur odore, neque in iis locis nascatur, ubi cætera genera. Hoc decorticatum affertur, & *Ligno Brasiliano* dicto sæpè adulteratur; verùm licet utrumque sit inodorum, attamen *Santalum* neque dulce est, neque inficere debet. *Brasilianum* & dulce est, & inficit: ponderosior, quin etiam & solidior hujus materia, idèdque aquæ injectum statim fundum petit. Nostrum *Santalum* rubrum dulce est, & inficit; quare fortè

184 PHARMACOPOEA
spurium & adulterinum erit dicendum.

Sapphyrus, est gemma pellucida, constans colore cæruleo sive cyaneo, perquam translucido, cælique sereni colorem referens, splendore & perspicuitate summâ; est gemmarum omnium durissima, Adamante excepto: optimus apud *Indos* reperitur.

Sarcocolla, cujusdam arboris peregrinæ, & Gummi ab ipsa manantis nomen est. Nascitur in *Perside* fructuosa & spinosa ramis nodosis, & arbori appressis, ex quibus fauciatis, & interdum spontè profluit lacryma *Thuris pollini* similis, colore subrufa, amara sapore citrà morsum, dulcedinem *Glycyrrhizæ* referens. Adulteratur Gummi, sed gustu deprehenditur, adulterata enim amara non est.

Sarsaparilla, planta est multis radicibus nitens, duos cubitos aut ampliùs longis, colore cinereo dilutior, quæ interdum tam altè demittuntur, ut qui integras eruere velit, ei profundâ fossione opus sit. Ex *Hispania nova*, & Provincia *Honduras* transfertur. Matthiolus & Dodonæus putant esse eandem cum *Smilacæ nostratæ*; dissident tamen inter se multum, nam *Smilacis asperæ* radix nodosa est, & geniculata, graminis ritu, multoque brevior & mollior. Enodis verò est *Sarsaparillæ* radix, nullis geniculis asperata, dura, fibrosa, rugosa, medullosa, & aliquando viginti pedes longa, atque Viminis instar faciliè finditur. Deligenda est candida ad
pal-

pallorem tendens, recens, non cariōsa, sed medullosa, fractu contumax & ponderosa: nam quæ cariem sensit, & dum frangitur pulverulenta est, inutilis existimanda.

Sassafras arbor magna est, folia ferens ficulneis similia, & in tres partes divisa, stipites leves, subrubcos, & fœniculum olentes. Nascitur in Provincia *Florida* & *Mechuanensi*, ejus lignum optimum est recens, acri sapore præditum, ad cinereum eolorem tendens, atque suum corticem retinens: nam quod cortice caret, vile & invalidum censetur.

Scammonii nomine succus plantæ cujusdam concretus, & planta ipsa intelligitur, quibusdam tamen magis propriè hæc *Scammonia*, ille *Scammonium* dici videtur. Est verò planta lactaria, volvulosa, scanforia, lævis *Smilacis* modo, cui foliis, flore, & facie valdè similis est, sed radice non parùm dissimilis, quæ in *Smilace* tenuis est, in *Scammonio* crassa, prælonga, intus candida, odore gravis, & multo succo prægnans; ex eaque tenues & viticulosi furculi prodeunt, qui vicinos frutices conscendunt, amplexantur, & se implicant, folia ei lata & acuminata sunt instar *Arisari*, sed minora. Flores albidii, concavi, Calathi figura; nascitur uberius in pingui solo, præsertim in *Antiochia* & *Syria*. Ex ipsius radice *Scammonium* vulgò dictum, seu liquor colligitur plurimis modis, ut videri poterit ex Rænodeo, Theodoro & Cor-

Corbeio. *Mesue* laudat *Antiochenum*, subalbum, Gummi modo clarum, aut varium, quod fractum salivæ aut aquæ contactu lactescat, fractu facile, læve, odoris non tetri. *Dioscoridi* probatur læve, nitidum, rarum, fungosum, venulis exilibus. Adulteratum quoque aquæ contactu lactescit; sed adulterium vehementi acrimoniâ deprehendi ait.

Schœnanthum, id est *flos Junci odorati*, omnibus notum. Eligendum rufum, intenso colore, recens, tenue, rubentibus fragmentis, quod manibus fricatum Rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam, eligatur floribus refertum, si fieri potest.

Sena duplex habetur, una est acutioribus angustioribusque foliis, quæ ex *Alexandria Ægypti*, vel ex *Syria Venetia* defertur, & vocatur *Sena Orientalis Alexandrina*, *Syriaca*, *Ægyptia*, *Sena minor*. Altera est latioribus rotundioribusque foliis, & in *Italia* spontè, vel lævi culturâ æstivis tantum mensibus provenit, undè magna copia deportatur. Hæc vilior est, & *Orientali* longè inefficacior, ita ut hujus uncia tantum præstet, quàm *Orientalis* semuncia. Probatur recens, viridis, probè resiccata, non maculosa, nec teredine exesa, nec stipitum admixtione fraudata. Ejus folliculi foliis præferuntur recenter siccati, colore è viridi obscuro, & *Senæ* odorem referentes; evanidi namque, seminibus vacui, putidi, ac male olentes purgatoriâ vi destituuntur.

Smaragdus, quo nihil viridius, tanti splendoris existit, ut oculos intuentium perstringat: translucidus debet esse, nitens & colore excellens; ejus bonitas cognoscitur, si in os sumptus frigidus sentiat, & carbonibus injectus non ardeat, nec flammam emittat.

Styrax Calamita succus est arboris cujusdam *Syriacæ*, qui è *Pamphilia* advehitur intrà calamos, ne quid suavis odoris amittat. Præfertur rufescens, crassa, spinosa, albicantibus grumis plena, odore jucundo atque perseverante dotata. Deterior nigra, fursurosa, situ obducta & inodora; adulteratur ligni ipsius scobe, melle, cerâ, adipe odoribus imbuto, & quibusdam aliis; dignoscitur, quod adulterata invalido sit odore; sincera verò admodum acris sit.

Succini tres præcipuè sunt differentiæ ex colorum varietate: prima lutea est, gratâ perspicuitate transparens, auri colorem repræsentans: altera alba, imò candidissima est, rara, sed optima: tertia obscura, confusos & variè mixtos colores obtinens. Probat, illa, quæ attritu calefacta illicò paleas, aliasque res minutas ad se trahit, fulva ac translucens, & quæ accensa *Bituminis* odorem reddit.

Tacamahaca ex nova Hispania defertur, est Gummi seu resinæ genus collectum è vulnerata arbore magna, instar *Populi*, admodum odorata, cujus fructus est ruber, *Pæoniæ* seminis modo.

Tamar-

Tamar-Indus arbor est, in qua nascuntur *Tamarindi*, procera, *Costaneæ* aut *Fraxini* modò, dura, compacta, multis cincta ramis, & foliis armata minutim incisæ palmi magnitudine. Fructus hi immaturi virent, & acidi sunt; maturi subcineritii, eorumque tunc aciditas suavitate non caret. Probantur colore nigro rufescentes, multis villis intertexti, recentes, lenti, pingues, vinosi, jucundâ tamen aciditate grati, nucleos intus continentes sativorum *Lupinorum* magnitudine, quodammodò rotundos, sed planos, colore fulvos, & leves. Servantur in fictile vitreatum coacti, loco frigido & sicco. Adulterantur *Prunorum* carne, sed in his nigredo est obscura, humidiores sunt, & *Prunorum* odor & sapor illis inest.

The herba, seu *Frutex Chînensi*, *Tsia* verò *Japonibus*, eadem sunt. Foliorum decoctum illis *The*; his *Tsia* itidem dicitur, licet *Chînensium Tsia* ob majorum foliorum macerationem, & coctionem nigrum *The* appelletur. *Japonensium Tsia* ob minorum in summitate fruticis foliorum præparationem gratioris utique sit saporis, majorisque efficacix, ac altioris quoque pretii. Omnis *The*, sive *Tsia*, nullibi terrarum (quantum quidem constat) nisi in *Japoniæ*, *Chinæ*, & *Chiam* campis colitur; exurgitque ad *Ribesiorum*, vel *Rosæ Europææ* molem & altitudinem. Caules & ramusculi totius fruticis à pede usque ad verticem perpetuis & infinitis floribus &

foliis tenuibus acuminatis, in ambitu crenatis, incisfis & dentatis instar serræ, ornatè vestiuntur. *Bellidis* aut *Chamaepityos* foliis similibus, ab acetosa silvestri diversis, &c.

Quæ ejusdem licet formæ, diversæ adeò sunt magnitudinis, ut quinque differentiæ foliorum uni, eidemque frutici adnatorum appareant. Prima & maxima in inferioribus ramusculis, *Balsami hortensis* foliis simillima existunt. His succedunt ea, quæ secundæ magnitudinis, & prioribus multò minora sunt, ut sic gradatim ascendencia quinques manifestè differant.

Verùm quantum hæc folia sursum magnitudine decrescunt, tantum pretio accrescunt. Hæc Guilielmus Piso in annotationibus ad historiam naturalem & medicam *Indiæ Orientalis*, Jacobi Bontii paginâ 87. 88. 89. quippè primæ magnitudinis exsiccatarum & præparatarum libra valet quinque asses; secundæ quinquaginta; tertiæ verò quinque florenos; quartæ quindecim; quintæ & ultimæ magnitudinis quinquaginta: imò subindè centum & quinquaginta florenos valet, si ritè præparata fuerint folia.

Flores porrò fert *The* albicantes, magnitudine, figurâ, colore, *Rosæ silvestri Europæ* (quæ *Eglancier* vocatur) excepto odore, simillimos. Quorum foliolis decidantibus, umbilicus manet, ubi semen horum fruticum rotundum, & nigrum continetur *Rosarum* instar, quod terræ com-

commiffum novas producit plantas triennii fpatio. Ex quorum foliis melfis luculenta illis annuatim redit, etiam iis *Japoniæ* locis, ubi gelu & nix vigent æquè ac in *Hollandia*. Radices funt fibrofæ, & in minimas particulas difperfæ circa terræ fuperficiem, nullius hætenus ufus habitæ: ita ut fola hujus decantatæ plantæ feu fruticis præftantia in frondibus exiftat, quæ VERE *Japonenfi* lectæ & in umbra exficcatæ ad quotidianas decoctiones refervantur. Quantum ad faporem foliorum *Theæ*, præter amaritudinem & calorem, aromaticum quid, & tenuitatem partium prædominantem potiùs, quàm adftrictionem, arguere videntur.

Petrus Borrellus hiftoriarum, & obfervationum rariorum Medico-Phyficarum Centuria 3. obfervatione 39. de *Thea* fic inquit: In duabus tantùm *Chinæ* Provinciis arbor *Thea* dicta reperitur, ex Alexandri de Rhodes peregrinationum hiftoria, quæ *Bellidis* folia habet, & in una quàm in alia major eft. Magnis curis colliguntur hæc foliola femel in anno (ut nos hîc in Gallia Uvas colligimus) ex arbore *Myrti* folio prædita. Bulliuntur in aqua, & tunc extendi poffunt, & eorum forma percipi, &c.

Terebinthina vera ex *Terebintino*, feu *Termintho* arbore (ut *Græci* dicunt) habetur. Eft enim liquor pinguis ex ejus trunco & ramis defluens. Optima eft clara, perlucida, alba, acris & odorata. Laudatur quæ

quæ ex *Chio Insula* defertur, *Chia* ob id nuncupata: hæc odore & gustu cæteris antecellit, & plus *Terebinthi* refert. Quæ cum ad nos non advehatur, *Abietina*, quæ ex *Abiete* aut *Laricea*, quæ ex *Larice* effluit, loco illius substitui possunt.

Terra Lemnia præstantissima habetur, quæ ex *Insula Lemno* defertur, in placentulas efformata, ac aliquo plerumque sigillo obsignata, & idèd sigillata vocatur, rufo plerumque est colore, pinguis adèd, ut è sævo constare videatur, dum in ore contenta linguæ & labiis admovetur.

Thus est arbusculæ cujusdam in *Arabia* nascentis lacryma resinosa. Duo traduntur genera: unum dicitur *Olibanum*, seu *Thus masculinum*, quod ex albo flavescit, limpidum, pellucidum, pingue ac siccum est, resinæ *Cedriæ* puritatem, succinique nitorem emulatur. Alterum *fæmininum*, quod bonitate *masculo* cedit, resinosum magis ac molle, & citò ardens. Adulteratur admisto *Pini* aut *Nucis* ejus cortice; sed horum index ignis est: siquidem reliqui cortices suffiti, nequaquam incenduntur, & sine odore fumum eructant: *Tenris* verò cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem ejaculatur.

Tragacantha est lacryma, quæ ex plantæ *Tragacanthæ* radicibus colligitur, & per cribrum aut rarum linteum exprimitur, candida, pellucida, nitida (licet & flavesceus subrufa reperiatur) substantia est glutinosa, quæ difficulter teritur, & aquam, quâ

quâ dissolvitur, in densam mucilaginem instar glutinis convertit. Eligenda candidissima, parùm translucens, gracilis, lævis, syncera, subdulcis, & cujus minima portio maximam aquæ copiam coagulat. Quæ est antiquata, primùm pallefcit, deindè rufescit, tandem etiam flavescit, fitque hæc annis amara, ob idque calidior, atque ideò ad confectiões calidas potiùs adhibenda. Adfertur ex *Creta*, *Asia* & *Græcia*. Planta, seu Arbuscula *Tragacantha*, etiam in *Italiae* quibusdam locis reperitur.

Turbith. Præfertur intùs subalbum, foris cineritium, fractu facile, recens, & cujus caulis pars radici proxima, gummosa est. Improbatur vetus aut cariosum, quia viscera conturbat.

Xylobalsamum, lignum *Balsami* legitimum nondùm in officinis prostat, quale requirit. *Dioscorides*, recens, sarmento tenui, fulvum, odoratum, quadamtenùs *Opobalsamum* spirans. Quod verò pro eo ostenditur *Xylobalsamum* officinarum, alterius cujusdam arboris virgultum est, & potiùs *Myrtum* quàm *Balsamum* refert. Hinc fortè *Lentisci* (in *Italia* nascitur) furculi; modo non cariosi sint, sed recentes, nec odorem amiserint, & exsiccantes, moderatè quin & astringant, & aromatici sint. Alii tamen *Macis* & *Cyperis* æquales partes, alii *Santalum* flavum, alii *Cubebas* substituunt.



I N D E X
M E D I C A M E N T O R U M
C O M P O S I T O R U M
I N H A C
P H A R M A C O P O E A
C O N T E N T O R U M.

Aceta.

C Alendulæ,	24
Rosarum rubrarum,	
Sambuci &c.	<i>ibid.</i>
Acetum Stillatitium,	<i>ibid.</i>
Scylliticum,	<i>ibid.</i>
Theriacale,	25

Antidota & Opiata.

Confectio Alkermes,	71
Diascordium Fracastorii,	<i>ibid.</i>
Confectio Hyacinthorum,	72
Mitridatium,	73
Philonium Romanum,	74
Requies Nicolai,	75
Theriaca Andromachi,	76
N	The-

INDEX MEDICAMENTOTUM	
Theriaca Dia-Tessaron,	78
Electuarium è Succo Ruthæ,	<i>ibid.</i>

Aquæ simplices Stillatitiæ, 13

Aqua Mellis,	14
--------------	----

Aquæ Compositæ.

Aqua Anti-Scorbutica,	14
Catharralis,	<i>ibid.</i>
Cinnamomi,	15
Embryonum,	<i>ibid.</i>
Epileptica,	16
Hysterica,	17
Prophylactica,	<i>ibid.</i>
Theriacalis simplex,	18
Vitæ Composita,	<i>ibid.</i>
Vitæ Aulica,	19
Aqua seu Elixir Anti-Febrile,	20
Spiritus Carminativus,	19
Spiritus Aromaticus Oleosus seu Sal Vo-	
latile Oleosum,	20
Spiritus Vini Camphoratus,	21
Rectificatus,	<i>ibid.</i>
Tartarificatus,	144

Spiritus ardentes.

Cochleariæ,	21
Menthæ,	<i>ibid.</i>
Melissæ,	<i>ibid.</i>
Baccarum Sambuci,	<i>ibid.</i>
Juni-	

Cerata.

Ceratum de Crusta panis,	114
Ceratum Defensivum,	<i>ibid.</i>
Ceratum Matricale,	115
Ceratum Santalinum,	<i>ibid.</i>
Ceratum Stomachicum,	<i>ibid.</i>

Condita. 49*Conservæ & Saccharata.* 50*Decocta.*

Decoctum Hordei,	26
Cremor Hordei,	<i>ibid.</i>
Hordeatum Amygdalinum,	<i>ibid.</i>
Ptisana Communis,	<i>ibid.</i>
Decoctum Cordiale Medecinae,	27
Decoctum Solutivum,	<i>ibid.</i>
Decoctum Pectorale,	<i>ibid.</i>
Decoctum Clysteris emolliens,	28
Decoctum Carminativum,	<i>ibid.</i>
Decoctum Nephriticum,	<i>ibid.</i>
Decoctum Vulnerale,	29

Electuaria solutiva.

Benedictum laxativum,	52
Caryocostinum,	53

INDEX MEDICAMENTORUM

Cholagogum,	53
Dia-Catholicon,	<i>ibid.</i>
Dia-Phœnicon,	54
Hydragogum,	<i>ibid.</i>
E Succo Rosarum,	55
Hyera Picra,	<i>ibid.</i>
Confectio Hamech,	56
Passulæ Corinthiacæ laxativæ,	57

Emplastra.

Album Coctum,	116
De Baccis Lauri,	<i>ibid.</i>
De Betonica,	<i>ibid.</i>
Carminativum,	117
Althææ,	<i>ibid.</i>
De Cicutâ,	118
Dia-Palma,	<i>ibid.</i>
Dia-Chylon simplex,	<i>ibid.</i>
Dia-Chylon cum Gummis,	119
Dia-Phoreticum,	<i>ibid.</i>
Dia-Pompholygos,	120
Divinum seu Manus Dei,	<i>ibid.</i>
Epispasticum,	121
Filii Zachariæ,	<i>ibid.</i>
De Galbano,	<i>ibid.</i>
Gratia Dei,	<i>ibid.</i>
Gryseum seu de Lapide Calaminari,	122
Ad fracturas Ossium,	<i>ibid.</i>
Magneticum Arsenicale,	123
De Meliloto,	124
De Mucilaginis,	125
Oxycroceum,	<i>ibid.</i>
Stipticum Paracelsi,	126
De	

COMPOSITORUM.

De Ranis cum Mercurio,	127
Spannadrapium ad Fonticulos,	128
Spannadrapium Marchionis d'Este,	129

Looch sanum & expertum. 46

Mellita.

Mellis Despumatio,	44
Hydromel simplex,	<i>ibid.</i>
Oxymel simplex,	<i>ibid.</i>
Oxymel Scylliticum,	45
Oxymel Marrubiatum,	<i>ibid.</i>
Mel Mercuriale,	<i>ibid.</i>
Rosarum,	<i>ibid.</i>
Diamorum,	<i>ibid.</i>

Olea per expressionem.

Oleum Amygdalarum dulcium &c.	93
Oleum Ovorum,	<i>ibid.</i>

Olea Simplicia per infusionem & Decoctionem.

Rosatum,	94
Camomelinum,	<i>ibid.</i>
Liliorum arborum,	<i>ibid.</i>
Nymphææ,	<i>ibid.</i>
Rutæ,	<i>ibid.</i>
Violarum,	<i>ibid.</i>

INDEX MEDICAMENTORUM

Olea Composita per infusionem & Decoctionem.

De Capparibus,	94
De Calloreo,	95
Catellorum,	96
Croci,	<i>ibid.</i>
De Euphorbio,	97
Hyperici Compositum,	<i>ibid.</i>
Lumbricorum terrestrium,	98
Mastichinum,	<i>ibid.</i>
Myrtillorum,	<i>ibid.</i>
Mucaginum,	<i>ibid.</i>
Vulpinum,	99

Olea per destillationem.

Abfynthii,	100
Seminis Anisi,	<i>ibid.</i>
De Baccis Juniperi, &c.	101
Oleum Ceræ,	<i>ibid.</i>
De Lateribus.	102
Myrrhæ per deliquium,	<i>ibid.</i>
Terebinthinæ,	103

Pillulæ.

Alcôphanginæ,	79
Cochiæ,	80
Fœtidæ,	<i>ibid.</i>
De Nitro,	81
Ruffi,	<i>ibid.</i>
	Sple:

COMPOSITORUM.

Spleneticæ,	81
De Cynoglossâ,	82
Extractum Catholicon,	<i>ibid.</i>
Laudanum Opiatum,	83
Resina Scammonii,	<i>ibid.</i>

Extractorum conficiendorum modus generalis. 83

Pulveres Aromatici & alii.

Aromatici Rosati.	58
Dia-Margariti frigidi.	<i>ibid.</i>
Diambræ.	59
Dianthos.	60
Diarrhodonis.	<i>ibid.</i>
Diatragacanthi frigidi.	61
Lætificantis.	<i>ibid.</i>
Dia-Curcumæ.	62
Dia-Galangæ.	63
Bezoardicus Magistralis.	<i>ibid.</i>
E Chelis Cancrorum.	64
Cachecticus.	<i>ibid.</i>
Ad Casum.	<i>ibid.</i>
Liberans.	65
Contra Abortum.	<i>ibid.</i>
De Gutteta.	66
Haly.	<i>ibid.</i>
Hemophthoicus.	67
Pleuriticus.	<i>ibid.</i>
Reginæ.	<i>ibid.</i>
Stomachicus.	68
Contra Vermes.	<i>ibid.</i>

INDEX MEDICAMENTORUM

Pulveres solutivi.

Catholicus,	69
Dia-Carthami,	<i>ibid.</i>
Dia-Turbith cum Rheo,	<i>ibid.</i>
Hermodaetylatae Venetae,	70
Sennae Montagnanae,	<i>ibid.</i>
Pro Suppositoriis,	<i>ibid.</i>

Rob.

Berberorum,	48
Ceraforum nigrorum,	<i>ibid.</i>
Ribefiorum,	<i>ibid.</i>
Cydoniorum,	<i>ibid.</i>
Sambuci,	<i>ibid.</i>

Syrupi.

Hederæ terrestris,	30
Ex Succo Limonum,	<i>ibid.</i>
Berberis,	<i>ibid.</i>
Granatorum Acidorum,	<i>ibid.</i>
Dulcium,	<i>ibid.</i>
Ribefiorum,	<i>ibid.</i>
De Absynthio,	31
De Althæâ,	<i>ibid.</i>
De Arthemisia,	32
Capillorum Veneris,	33
De Chicoreo compositus,	34
De Cortice Citri,	<i>ibid.</i>
De Eryfimo,	35
De	

COMPOSITORUM.

De Hyssopo,	35
De Menthâ,	36
Myrtinus,	37
Papaveris albi,	<i>ibid.</i>
Papaveris Erratici,	38
De Pæoniâ,	<i>ibid.</i>
De quinque Radicibus,	<i>ibid.</i>
De Rosis siccis,	39
De Scordio,	<i>ibid.</i>
De Symphito,	40
De Stœchade,	<i>ibid.</i>
Violaceus,	41
De Chicoreo cum Rheo,	<i>ibid.</i>
Florum Persicorum,	42
De Polipodio,	<i>ibid.</i>
De Rhamno Cathartico,	43
Regis Solutivus,	<i>ibid.</i>
Rosarum Solutivus,	44

Tabellæ.

Tabellæ Aromatici Rosati,	50
Diacodii,	<i>ibid.</i>
Saccharum Perlatum,	51

Tincturæ.

Tinctura Croci,	22
Cinnamomi,	<i>ibid.</i>
Castorei,	<i>ibid.</i>
Gummi Laccæ,	<i>ibid.</i>
Opii seu Laudanum liquidum,	<i>ibid.</i>
Salis Tartari,	23
Succi-	

INDEX MEDICAMENTORUM.

Succini,	23
Elixir proprietatis,	<i>ibid.</i>
Essentia Absynthii,	84

Trochisci.

Agaricus Trochiscatus,	85
Albi Rhafis,	<i>ibid.</i>
Alhandal,	86
Alkekengi,	<i>ibid.</i>
Bechici nigri,	87
De Capparibus,	<i>ibid.</i>
De Carabe,	88
Cypheos,	<i>ibid.</i>
Gordonii,	89
Hedychroi,	90
De Myrrhâ,	91
Scyllitici,	<i>ibid.</i>
De Terra Sigillata,	92

Unguenta.

Ægyptiacum,	104
Album,	<i>ibid.</i>
Althææ,	<i>ibid.</i>
Apostolorum,	105
De Arthanitâ,	<i>ibid.</i>
Aureum,	106
Basilicon,	107
Enulatum cum Mercurio,	<i>ibid.</i>
De Glycirrhiza,	108
Martiatum,	109
Neapolitanum,	110
Nu-	

COMPOSITORUM.

Nutritum,	III
Populeon,	<i>ibid.</i>
Rosatum,	III2
Balsamum Arcæi,	III3
Balsamum Lucatelli,	<i>ibid.</i>
Balsamum Viride,	<i>ibid.</i>

Præparationes Simplicium Medicamentorum.

Cinnabaris,	130
Conchæ,	<i>ibid.</i>
Corallorum,	131
Chelorum Cancrorum,	<i>ibid.</i>
Margaritarum,	<i>ibid.</i>
Oculorum Cancri &c.	<i>ibid.</i>
Lapidis Lazuli,	<i>ibid.</i>
Aluminis ustio,	<i>ibid.</i>
Butyri majalis,	132
Cochlearum testarum,	<i>ibid.</i>
Cornu Cervi Spagyrica præparatio,	<i>ibid.</i>
Millepedum,	133
Opii Correctio,	<i>ibid.</i>
Plumbi ustio,	<i>ibid.</i>
Scammonii præparatio,	<i>ibid.</i>
Tuthiæ,	134

Medicamenta Spagyrica.

Crocus Martis adstringens,	135
Crocus Martis cum Sulphure præpar.	<i>ibid.</i>
Magisterium Martis aperitivum,	136
Tinctura Martis,	<i>ibid.</i>
	Vitrio-

COMPOSITORUM.

Sal Prunellæ,	148
Oleum Tartari per deliquium,	<i>ibid.</i>
Sal Nitri fixum ejusque liquor.	149

Salis Essentialis conficiendi modus. 149

Spiritus Cornu Cervi,	150
Sal Volatile Cornu Cervi,	<i>ibid.</i>
Sal Volatile & Oleum Succini,	151
Spiritus Salis Armoniaci,	<i>ibid.</i>
Flores Salis Armoniaci,	<i>ibid.</i>
Spiritus Nitri,	152
Spiritus Salis,	<i>ibid.</i>
Spiritus Salis dulcis,	153 •
Lapis Infernalis,	<i>ibid.</i>
Ruptorium Commune,	<i>ibid.</i>
Lapis Medicamentofus Crollii,	<i>ibid.</i>
Aqua Fortis,	154

F I N I S.









17

